

Some tree species of ecological importance in Mexico: A documentary review

Algunas especies arbóreas de importancia ecológica en México:
una revisión documental

Marín Pompa-García^{*1}; José Á. Sigala Rodríguez²; Enrique Jurado³

¹Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Ciencias Forestales. Río Papaloapan y bulevar Durango s/n, col. Valle del Sur. C. P. 34120. Durango, Durango, México.

²Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental Valle del Guadiana. Carretera Durango-Mezquital, km 4.5. C. P. 34170. Durango, Durango, México.

³Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales. Carretera Nacional km 145. C. P. 67700. Linares, Nuevo León, México.

Corresponding author: marinpompagarcia@gmail.com
Tel.: 52+ (618) 1301096.

Abstract

Introduction: Mexico is known worldwide for its floristic diversity that has promoted interest in keeping record of the ecological importance of those species.

Objective: This study shows a compilation of the scientific literature in which Mexican forest species are studied due to their importance, dominance, and abundance.

Materials and Methods: A total of 161 studies published from 1980 to 2015 were collected using specialized databases such as ISI Web of Science, Science Direct, Google Scholar, Latindex, SciELO and predefined keywords. Trends are analyzed and research perspectives are suggested to improve the current knowledge state on plant communities.

Results and discussion: According to the analysis of the studies, the number of publications increased 46 % in the last five years. Mexican journals report the highest number of contributions (69 %), mainly focused on tropical deciduous forest (19 %). The dominant species are *Quercus* (Fagaceae), *Pinus* (Pinaceae), *Acacia* (Fabaceae) and *Bursera* (Burseraceae).

Conclusion: The increase in publications in recent years is evidence of growing interest in this area; however, studies conducted for species or plant communities with some category of risk are rare in the literature.

Resumen

Introducción: El reconocimiento de la diversidad florística que México posee a nivel mundial ha propiciado un creciente interés por documentar la importancia ecológica de sus especies.

Objetivo: En este trabajo se presenta una compilación de la literatura científica en la cual se estudian especies forestales mexicanas por su valoración de importancia, dominancia y abundancia.

Materiales y métodos: Se recopilaron 161 estudios publicados desde 1980 hasta 2015, mediante buscadores especializados como ISI Web of Science, Science Direct, Google Scholar, Latindex, SciELO y a través de palabras clave predefinidas. Se analizan las tendencias y se sugieren perspectivas de investigación para mejorar el estado actual del conocimiento sobre las comunidades vegetales.

Resultados y discusión: De acuerdo con el análisis de los estudios, el número de publicaciones incrementó 46 % en los últimos cinco años. Las revistas mexicanas reportan la mayor cantidad de contribuciones (69 %) enfocadas principalmente en la selva baja caducifolia (19 %). Las especies predominantes corresponden a los géneros *Quercus* (Fagaceae), *Pinus* (Pinaceae), *Acacia* (Fabaceae) y *Bursera* (Burseraceae).

Conclusion: El incremento de las publicaciones durante los últimos años es evidencia del interés creciente en este ámbito; sin embargo, los trabajos realizados para especies o comunidades vegetales con alguna categoría de riesgo tienen baja frecuencia en la literatura.

Keywords: Composition, structure, ecological indexes,

Mexican forest ecosystems, compilation, references.

Palabras clave: Composición, estructura, índices ecológicos, ecosistemas forestales mexicanos, compilación, revisión bibliográfica.

Introduction

Mexico is one of the four countries classified as megadiverse and hosts between 10 and 12 % of the planet's known terrestrial diversity (Sarukhán et al., 2009). Practically, all of the great vegetation types of the planet are found in this country (González-Medrano, 2003) and some ecosystems such as the wetlands of Cuatro Ciénegas, Coahuila, are unique in the world (Espinosa, Escalante, Eguiarte, & Soauza, 2005). This diversity of ecosystems is related to the heterogeneity of the physical environment, which in turn is the product of a complex geological and climatic history (Espinosa-Organista et al., 2008). The geographic location where two biogeographic regions converge, the Nearctic region and the Tropical region, has also favored a high degree of endemism in the Mexican flora (Rzedowski, 1991).

Some research keeps record of the ecological value of Mexican ecosystems, whether due to its diversity (Balvanera, Lott, Segura, Siebe, & Islas, 2002; Castillo-Campos, Halffter, & Moreno, 2008), distribution (Gelviz-Gelvez & Pavón-Hernández, 2013; Sánchez-González & López-Mata, 2003), degree of conservation (Encina-Domínguez, Encina-Domínguez, Mata-Rocha, & Valdes-Reyna, 2008; García-Arévalo, 2008; Huerta-Martínez & García-Moya, 2004; Santibañez-Andrade, Castillo-Argüero, & Martínez-Orea, 2015) or structural variables (Cuevas-Guzmán et al., 2011; Mora-Donjuán et al., 2013; Vázquez, López, Montalvo, Méndez, & Castillo, 2010). Moreover, Mexican forest ecosystems are a source of various environmental services (Comisión Nacional Forestal [CONAFOR], 2012), such as the regulation of climatic conditions, water cycle (Bonan, 2008) and carbon sequestration (Ordóñez & Masera, 2001; Torres & Guevara, 2002). The values of importance, indices of wealth, diversity, dominance and abundance have become indicators that qualify the ecological contribution of the species in the forest ecosystems (Clark & Covey, 2012; Duelli & Obrist, 2003).

In spite of the heterogeneity of the Mexican forest ecosystems (González-Medrano, 2003) and the studies that highlight the ecological value of the species present (Estrada, Yen, Delgado, & Villarreal, 2004; Trejo & Dirzo, 2002), there is currently a lack of a database that systematizes the studies; that is to say, there is no systematic, updated and accessible report that contributes to the knowledge of the subject and supports the scientists interested in this area of research.

Therefore, the main aim of this study is to develop and present an exhaustive bibliographical review on importance assessment, composition, dominance and abundance studies of Mexican forest species, in order to contribute to their diagnosis and perspectives.

Introducción

México es uno de los cuatro países calificados como megadiversos y alberga entre 10 y 12 % de la diversidad terrestre conocida del planeta (Sarukhán et al., 2009). Prácticamente, la totalidad de los grandes tipos de vegetación del planeta se encuentran representados en el territorio (González-Medrano, 2003) y algunos ecosistemas como los humedales de Cuatro Ciénegas, Coahuila, son únicos en el mundo (Espinosa, Escalante, Eguiarte, & Soauza, 2005). Tal diversidad de ecosistemas está relacionada con la heterogeneidad del medio físico que, a su vez, es producto de una historia geológica y climática compleja (Espinosa-Organista et al., 2008). La ubicación geográfica donde convergen dos regiones biogeográficas, la Neártica y la Tropical, ha propiciado, además, un alto grado de endemismo en la flora mexicana (Rzedowski, 1991).

Existen investigaciones que documentan el valor ecológico de los ecosistemas del país, ya sea por su diversidad (Balvanera, Lott, Segura, Siebe, & Islas, 2002; Castillo-Campos, Halffter, & Moreno, 2008), distribución (Gelviz-Gelvez & Pavón-Hernández, 2013; Sánchez-González & López-Mata, 2003), grado de conservación (Encina-Domínguez, Encina-Domínguez, Mata-Rocha, & Valdes-Reyna, 2008; García-Arévalo, 2008; Huerta-Martínez & García-Moya, 2004; Santibañez-Andrade, Castillo-Argüero, & Martínez-Orea, 2015) o variables estructurales (Cuevas-Guzmán et al., 2011; Mora-Donjuán et al., 2013; Vázquez, López, Montalvo, Méndez, & Castillo, 2010). Además, los ecosistemas forestales mexicanos constituyen una fuente de diversos servicios ambientales (Comisión Nacional Forestal [CONAFOR], 2012), tales como la regulación de las condiciones climáticas, el ciclo del agua (Bonan, 2008) y la captura de carbono (Ordóñez & Masera, 2001; Torres & Guevara, 2002). Los valores de importancia, índices de riqueza, diversidad, dominancia y abundancia se han convertido en indicadores para calificar la contribución ecológica de las especies en los ecosistemas forestales (Clark & Covey, 2012; Duelli & Obrist, 2003).

A pesar de la heterogeneidad de los ecosistemas forestales mexicanos (González-Medrano, 2003) y de los estudios que resaltan el valor ecológico de las especies que contienen (Estrada, Yen, Delgado, & Villarreal, 2004; Trejo & Dirzo, 2002), a la fecha se carece de una base de datos que sistematice las investigaciones; es decir, no existe un reporte sistematizado, actualizado y accesible que contribuya al conocimiento del tema y sirva de apoyo a los científicos interesados en este ámbito de investigación.

Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo principal desarrollar y presentar una revisión bibliográfica exhaustiva sobre estudios de valoración de importancia, composición, dominancia y abundancia

Materials and methods

An extensive and systematic literature review was developed on the subject of interest using databases such ISI Web of Science, Science Direct, Google Scholar, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) and Scientific Electronic Library Online (SciELO). For that purpose, different combinations of a predefined list of keywords were used: "importance value index", "dominance", "structure", "composition", "ecological indexes", "terrestrial ecosystems", "tree species" and "Mexico". The search was delimited from January 1980 to December 2015, taking into account only articles in indexed journals. Although valuable information exists in theses, technical reports, and conference abstracts, these documents were not considered due to the lack of a peer review process.

In order to ensure the reliability and comparability of the review, we verified that the articles included the following criteria: 1) scientific name of the species studied, 2) tree species (> 10 cm in diameter) to prevent misunderstanding with herbaceous or shrubs and 3) explicit description of the ecological indexes used to qualify the ecological relevance of the species under study.

Each document was recorded in a database using Microsoft Access 2010® and was classified by species, genus, family and ecosystem, the state where the study was developed, name of the journal, volume, number and query string were also recorded. A frequency analysis was conducted for each of the classification variables to define the most studied ecosystems, families, genera and species.

Results and discussion

As a result of the review, a database was set up with 161 records of studies related to species of ecological importance in forest ecosystems in Mexico (Annex 1, available at https://chapingo.mx/revistas/xml/rchscfa/v23n2/markup_xml/scielo_package/2007-4018-rchscfa-23-02-00185-suppl.pdf). Articles were collected from 44 journals, 23 of these articles are Mexican publications and account for 69 % of the studies. More than 10 papers were collected from each one of five journals. The Journal *Revista Chapino Serie Ciencias Forestales y del Ambiente* has the largest number of articles on the subject (Table 1). The oldest study found was Lott, Bullock, and Solis-Magallanes (1987), which corresponds to a study of diversity and structure in an area of tropical deciduous forest in Jalisco. Most of the articles were published in the decade from 2001 to 2010; however, there has been a considerable increase in the last five years (2011 to 2015).

de especies forestales mexicanas, con la finalidad de contribuir a su diagnóstico y perspectivas.

Materiales y métodos

Una revisión extensiva y sistemática de literatura se elaboró sobre el tema de interés en bases de datos como ISI Web of Science, Science Direct, Google Scholar, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex) y Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para ello, se usaron diferentes combinaciones de una lista predefinida de palabras clave: "índice de valor de importancia", "dominancia", "estructura", "composición", "índices ecológicos", "ecosistemas terrestres", "especies arbóreas" y "México". La búsqueda se delimitó al periodo de enero de 1980 a diciembre de 2015, considerando solamente artículos en revistas indizadas y con arbitraje. Aunque existe información valiosa en tesis, reportes técnicos y resúmenes de conferencias, no se consideraron estos documentos debido a la falta de un proceso de revisión por pares.

Para asegurar la confiabilidad y la comparabilidad de la revisión efectuada, se verificó que los artículos incluyeran los siguientes criterios: 1) proveer el nombre botánico en nomenclatura científica de las especies estudiadas, 2) incluir especies arbóreas (> 10 cm de diámetro) para evitar confusión con herbáceas o arbustos y 3) describir explícitamente los índices ecológicos utilizados, para calificar la notoriedad ecológica de las especies bajo estudio.

Cada documento se registró en una base de datos en Microsoft Access 2010® y se clasificó por especie, género, familia y ecosistema, además de registrar la entidad federativa donde se desarrolló el estudio, nombre de la revista, volumen, número y liga de la consulta. Se hizo un análisis de frecuencias por cada una de las variables de clasificación para definir los ecosistemas, familias, géneros y especies que más se han estudiado.

Resultados y discusión

Como resultado de la revisión se conformó una base de datos con 161 registros de estudios relacionados con especies de importancia ecológica en los ecosistemas forestales en México (Anexo 1, disponible en https://chapingo.mx/revistas/xml/rchscfa/v23n2/markup_xml/scielo_package/2007-4018-rchscfa-23-02-00185-suppl.pdf). Los artículos se localizaron en 44 revistas, 23 de éstas son publicaciones mexicanas y concentran 69 % de los estudios. En cinco revistas se encontraron más de 10 trabajos. La Revista Chapino Serie Ciencias Forestales y del Ambiente cuenta con el mayor número de artículos sobre la materia (Cuadro 1). El trabajo con la mayor antigüedad es el de Lott, Bullock, y Solis-Magallanes (1987), que corresponde a un estudio de diversidad y estructura en un área de la selva baja

Table 1. Peer reviewed scientific journals in which articles related to the study of forest species of ecological importance in Mexico have been published.**Cuadro 1. Revistas científicas con proceso de revisión por pares en las que se han publicado artículos relacionados con el estudio de especies forestales de importancia ecológica en México y de alta frecuencia de aparición en la literatura.**

| Journal/Revista | Country/País | 1980-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2015 | Total |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Mexico | | | 4 | 11 | 15 |
| Polibotánica | Mexico | | | 7 | 6 | 13 |
| Madera y Bosques | Mexico | | 1 | 6 | 5 | 12 |
| Boletín de la Sociedad Botánica de México | Mexico | | | 9 | 1 | 10 |
| Forest Ecology and Management | USA | | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Revista Mexicana de Biodiversidad | Mexico | | | 2 | 8 | 10 |
| Ciencia UANL | Mexico | | | 4 | 5 | 9 |
| Acta Botánica Mexicana | Mexico | | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Revista Mexicana de Ciencias Forestales | Mexico | | | 1 | 6 | 7 |
| Vegetation/Plant Ecology | International/ Internacional | 3 | | 3 | | 6 |
| Biodiversity and Conservation | Internacional | | | 5 | | 5 |
| Foresta Veracruzana | Mexico | | | | 5 | 5 |
| Interciencia | Venezuela | | | 4 | 1 | 5 |
| Botanical Sciences | Mexico | | | | 5 | 5 |
| Anales del Instituto de Biología. Serie Botánica | Mexico | | | 4 | | 4 |
| Revista Iberoamericana de Ciencias | USA | | | | 3 | 3 |
| Universidad y Ciencia | Mexico | | | 3 | | 3 |
| Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales | Spain/España | | | 2 | | 2 |
| Journal of Vegetation Science | International/ Internacional | | | 2 | | 2 |
| Kuxulkab' | Mexico | | | 1 | 1 | 2 |
| Phyton | Argentina | | | | 2 | 2 |
| Others*/Otros* | | 1 | 1 | 10 | 11 | 23 |
| Total | | 4 | 7 | 75 | 75 | 161 |

*Journals with only one article was published.

*Revistas en las que se encontró solo un artículo publicado.

Ecosystems studied

Of the 161 articles collected, 37 (about 19 %) were related to the study of species in the tropical deciduous forest (Rzedowski, 1978). The second ecosystem by study frequency is the pine-oak forest with 20 articles (Figure 1). The less studied ecosystems were those with smaller surface in the country such as the vegetation of petenes (known locally under that name) and coastal dunes.

The largest number of families, genera and species studied is located in the tropical deciduous forests (Figure 1). This ecosystem has a wide distribution in the Mexican territory and is characterized by the

caducifolia en Jalisco. La mayoría de los artículos se publicaron en la década del 2001 a 2010; no obstante, se observa un incremento considerable en los últimos cinco años (2011 a 2015).

Ecosistemas estudiados

De los 161 artículos encontrados, 37 (cerca de 19 %) están relacionados con el estudio de especies de la selva baja caducifolia, también clasificada como bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 1978). El segundo ecosistema por frecuencia de estudios es el bosque de pino-encino con 20 artículos (Figura 1). Los ecosistemas menos estudiados corresponden a los de menor superficie en el país como la vegetación de petenes y de dunas costeras.




Figure 1. Number of studies and families, genera and species cited as ecologically important per ecosystem (classification according to INEGI, 2015) in the period 1980-2015. SBC: Tropical deciduous forests, BPQ: Pine-oak forest, MET: Tamaulipan thornscrub, BM: Cloud forest, BP: Pine forest, SMQ: Tropical evergreen forest, SMS: Semi-evergreen seasonal forest, BQ: Oak forest, MSM: Submontane scrub, SMP: Seasonal evergreen forest, MG: Gallery forest, SAP: Tropical rain forest, BA: Oyamel fir forest, BQP: Oak-pine forest, MKX: Mezquital xerophilous vegetation; VM: Mangrove, MDM: Desert known in Mexico as Matorral desértico micrófilo, PN: Natural grassland vegetation, BS: Ayarín forest, MDR: desert known in Mexico as Matorral desértico rosetófilo, SBP: Thorn forest, SBQP: low semi-deciduous forests, SMC: Deciduous forest, MJ: Pinewood forest, BJ: Juniper forest, VU: Vegetation of coastal dunes, PI: Induced grassland, VPT: Vegetación de petenes, VS: Savanna.

Figura 1. Número de estudios realizados y familias, géneros y especies reportadas como ecológicamente importantes por ecosistema (clasificación de acuerdo con INEGI, 2015) en el periodo 1980-2015. SBC: Selva baja caducifolia, BPQ: Bosque de pino-encino, MET: Matorral espinoso tamaulipeco, BM: Bosque mesófilo de montaña, BP: Bosque de pino, SMQ: Selva mediana subperennifolia, SMS: Selva mediana subcaducifolia, BQ: Bosque de encino, MSM: Matorral submontano, SMP: Selva mediana perennifolia, MG: Bosque de galería, SAP: Selva alta perennifolia, BA: Bosque de oyamel, BQP: Bosque de encino-pino, MKX: Mezquital xerófilo; VM: Manglar, MDM: Matorral desértico micrófilo, PN: Pastizal natural, BS: Bosque de ayarín, MDR: Matorral desértico rosetófilo, SBP: Selva baja perennifolia, SBQP: Selva baja subperennifolia, SMC: Selva mediana caducifolia, MJ: Matorral de coníferas, BJ: Bosque de táscale, VU: Vegetación de dunas costeras, PI: Pastizales inducidos, VPT: Vegetación de petenes, VS: Sabana.

dominance of extended treetops with heights between 7 and 8 m, and by a high density of shrub species (Trejo, 1999); furthermore, it is distinguished by its high diversity of species and endemic species (Rzedowski, 1991).

Figure 2 shows the number of studies per state. Most of the studies have been conducted in the state of Nuevo Leon (35) followed by Jalisco (17); in the first case, the number corresponds to studies in scrub ecosystems, such as Tamaulipan thornscrub (17) and submontane scrub (9), and pine-oak forests (13). In Jalisco, studies have been conducted mainly in the tropical deciduous forests (11).

El mayor número de familias, géneros y especies estudiadas se encuentra en la selva baja caducifolia (Figura 1). Este ecosistema tiene amplia distribución en el territorio mexicano y se caracteriza por la dominancia de árboles de copas extendidas con alturas de entre 7 y 8 m, así como por una alta densidad de especies arbustivas (Trejo, 1999); además, se distingue por su alta diversidad de especies y endemismos (Rzedowski, 1991).

La Figura 2 presenta el número de estudios reportados por entidad federativa. La mayoría se ha desarrollado en el estado de Nuevo León (35) seguido de Jalisco (17); en el primer caso, el número corresponde a estudios en




Figure 2. Number of studies with indexes of ecological importance of arboreal species from the period 1980-2015 per state, in Mexico.

Figura 2. Número de estudios con índices de importancia ecológica de especies arbóreas reportados en el periodo 1980-2015 por entidad federativa en México.

Main botanical families

Figure 3 shows botanic families and their importance value index from the studies collected. The most frequently cited families were Fabaceae, Fagaceae, and Pinaceae; on the other hand, those cited only in one study were: Actinidiaceae, Annonaceae, Asteraceae, Cupressaceae, Meliaceae, Nyctaginaceae, Platanaceae, Polygonaceae, Rhizophoraceae, Rosaceae, Rubiaceae, Salicaceae, and Sapindaceae. The families found with higher value in the index of ecological importance (> 70) were Acanthaceae (*Avicennia germinans* [L.] Stearn), Rhizophoraceae (*Rhizophora mangle* L.), belonging to the mangrove ecosystems, and Apocynaceae with the genus *Tabernaemontana* in the tropical deciduous forests. The families with a higher number of studies (Fagaceae, Fabaceae, and Pinaceae) showed values of average importance from 27 to 34.

ecosistemas de matorrales, como el matorral espinoso tamaulipeco (17) y matorral submontano (9), así como bosques de pino-encino (13). En Jalisco, los estudios se han conducido principalmente en la selva baja caducifolia (11).

Principales familias botánicas

La Figura 3 reporta las familias botánicas y su índice de valor de importancia a partir de los trabajos encontrados. Las familias referidas con mayor frecuencia fueron Fabaceae, Fagaceae y Pinaceae; en contraste, las reportadas solo en un estudio fueron: Actinidiaceae, Annonaceae, Asteraceae, Cupressaceae, Meliaceae, Nyctaginaceae, Platanaceae, Polygonaceae, Rhizophoraceae, Rosaceae, Rubiaceae, Salicaceae y Sapindaceae. Las familias reportadas con mayor valor en el índice de importancia ecológica (> 70)




Figure 3. Frequency of studies per botanical family and index of value of average importance in ecosystems of Mexico in the period 1980-2015. *Families without IVI cited in the studies.

Figura 3. Frecuencia de estudios por familia botánica y su índice de valor de importancia promedio en los ecosistemas de la república mexicana en el periodo 1980-2015. *Familias sin IVI reportado en los estudios.

Main Genus and Species

According to Figure 4, the most frequently cited genus were *Quercus* (Fagaceae), *Pinus* (Pinaceae) and *Acacia* (Fabaceae), which is consistent with the family analysis. Another important genus was *Bursera* (Burseraceae) characteristic of the tropical deciduous forests. In relation to the importance value index at the genus level, *Sabal* has obtained the highest value, although this was only found in two studies carried out in the petenes and the deciduous forest. *Haematoxylum*, common in the tropical deciduous forest, had also high values of importance. *Hymenaea*, *Avicenia*, *Pseudotsuga* and *Enterolobium* had values of importance greater than 100, although these values were only recorded in one study.

fueron Acanthaceae (*Avicennia germinans* [L.] Stearn), Rhizophoraceae (*Rhizophora mangle* L.), pertenecientes a los ecosistemas de manglar, y Apocynaceae con el género *Tabernaemontana* en la selva baja perennifolia. Las familias con mayor número de estudios (Fagaceae, Fabaceae y Pinaceae) fueron reportadas con valores de importancia promedio de 27 a 34.

Géneros y especies principales

De acuerdo con la Figura 4, los géneros reportados con mayor frecuencia fueron *Quercus* (Fagaceae), *Pinus* (Pinaceae) y *Acacia* (Fabaceae), lo cual es consistente con el análisis por familia. Otro género también importante fue *Bursera* (Burseraceae) característico de las selvas bajas caducifolias. Respecto al índice de valor




Figure 4. Main genera of ecological importance and their average IVI value, found in Mexican forest ecosystems in the period 1980-2015. *Genus without cited IVI.

Figura 4. Principales géneros de importancia ecológica y su valor IVI promedio, reportados en ecosistemas forestales mexicanos en el periodo 1980-2015. *Géneros sin IVI reportado.

The families with a higher number of genera recorded were Fabaceae, Euphorbiaceae, and Asteraceae. Although the family Fagaceae was the most frequent in the studies, only present two genera (*Quercus* and *Fagus*). Figure 5 includes the most frequent species, among which are: *Bursera simaruba* (L.) Sarg., *Pinus pseudostrobus* Lindl. and *Havardia pallens* (Benth.), as well as some species of the genus *Quercus* such as *Q. rugosa* Née and *Q. laurina* Humb. & Bonpl.

There are a lot of studies that keep record and value the ecological importance of tree species in Mexico. Most of the research has been developed from a perspective of ecosystem structure analysis, with two directions. On the one hand, some describe the current condition that keeps a particular ecosystem and highlights the species of greater abundance and dominance under certain conditions of site or station

de importancia a nivel de género, se ha documentado a *Sabal* con el mayor valor, aunque este dato solo se reportó en dos estudios realizados en los petenes y la selva mediana subcaducifolia. El género *Haematoxylum*, característico de la selva baja caducifolia, también fue registrado con altos valores de importancia. Los géneros *Hymenaea*, *Avicenia*, *Pseudotsuga* y *Enterolobium* tuvieron valores de importancia mayores de 100, aunque solo fueron registrados en un trabajo.

Las familias con mayor número de géneros documentados fueron Fabaceae, Euphorbiaceae y Asteraceae. A pesar de que la familia Fagaceae fue de las más frecuentes en los estudios, solo aparece con dos géneros (*Quercus* y *Fagus*). La Figura 5 incluye a las especies encontradas con mayor frecuencia, dentro de las cuales destacan: *Bursera simaruba* (L.) Sarg., *Pinus pseudostrobus* Lindl. y *Havardia pallens* (Benth.), así como




Figure 5. Main tree species cited as ecologically important in Mexican ecosystems in the period 1980-2015.

Figura 5. Principales especies arbóreas reportadas como ecológicamente importantes en ecosistemas mexicanos en el periodo 1980-2015.

quality. In contrast, other studies provide ecological indicators that explain the structural condition of forests that have been disturbed by both anthropogenic and natural factors. The two perspectives of analysis have differed in recent years; thus, the first studies conducted in the 1980s, such as those by Lott et al. (1987); Bongers, Popma, Meave-Castillo, and Carabias (1988); Popma, Bongers, and Meave-Castillo (1988); and Arriaga and León-de la Luz (1989) in tropical forests, are distinguished because they describe the structural condition and diversity that these ecosystems preserve. On the other hand, since 2000, and especially in the last five years, the studies deal with aspects of the impact of anthropogenic and natural factors on forest structure, such as those conducted by Alanís-Rodríguez et al. (2008), Alanís-Rodríguez et al. (2008), Alanís-Rodríguez et al. (2010a), Alanís-Rodríguez et al. (2010b) y Alanís-Rodríguez, Jiménez-Pérez, Valdecantos-Dema, Aguirre-Calderón, and Treviño-Garza (2011). These papers analyze the diversity and tree structure of the forests in Nuevo León affected by forest fires.

The dissemination of research has diversified over time. The oldest studies recorded in this review correspond to international journals such as *Plant Ecology* (formerly known as "Vegetatio"), a trend that was maintained in the 1990s with the exception of three articles published in *Acta Botánica Mexicana*. It seems that the creation of new journals, the diversification of contents and their inclusion in indexes such as JCR (Journal Citation Reports), such as the case of the journal *Revista Chapingo Series Ciencias Forestales y del Ambiente*, has allowed research scientists to publish articles in national journals, together with the predominant Spanish language in these journals and perhaps the commitment of the Mexican research scientists to publish in national journals.

With regard to the number of publications, the trend has been increasing over the last five years, which may reflect a growing interest in the subject matter. Although an analysis of the reasons for such a trend goes beyond the scope of this study, it seems that in part this could be attributed to the anthropogenic and climatic vulnerability to which forest ecosystems undergo (Weber, Bugmann, Fonti, Rigling, 2008; Williams et al., 2013), without neglecting their economic importance and government support that motivate to improve the understanding of their structural variables. On the other hand, the consolidation of research groups on these topics (Annex 1) could also have caused the growing number of publications. To our knowledge, this is the first effort recording the studies at the national level, where ecological structural variables of some tree species are studied (Figures 1, 3 and 4). This provides a starting point with a synthesis of the research landscape of the structural ecology of plant communities and gives a perspective on the subject to research scientists.

algunas especies del género *Quercus* tales como *Q. rugosa* Née y *Q. laurina* Humb. & Bonpl.

Los trabajos que documentan y valoran la importancia ecológica de las especies arbóreas en México son numerosos. La mayor parte de las investigaciones se ha desarrollado desde una perspectiva de análisis de la estructura de los ecosistemas, notándose dos direcciones. Por un lado, algunos describen el estado actual que guarda un ecosistema en particular y remarcan las especies de mayor abundancia y dominancia en condiciones determinadas de sitio o calidad de estación. En contraparte, otros estudios reportan indicadores ecológicos que explican el estado estructural de los bosques que han sido perturbados tanto por factores antropogénicos como por los naturales. Las dos perspectivas de análisis se han diferenciado en años recientes; así, los primeros estudios realizados en la década de los ochenta, como los de Lott et al. (1987); Bongers, Popma, Meave-Castillo, y Carabias (1988); Popma, Bongers, y Meave-Castillo (1988); y Arriaga y León-de la Luz (1989) en selvas tropicales, se distinguen porque describen el estado estructural y diversidad que guardan dichos ecosistemas. En cambio, a partir del año 2000, y sobre todo en los últimos cinco años, los estudios abordan aspectos del impacto de los factores antropogénicos y naturales sobre la estructura de los bosques, como los realizados por Alanís-Rodríguez et al. (2008), Alanís-Rodríguez et al. (2010a), Alanís-Rodríguez et al. (2010b) y Alanís-Rodríguez, Jiménez-Pérez, Valdecantos-Dema, Aguirre-Calderón, y Treviño-Garza (2011). Dichos trabajos analizan la diversidad y estructura arbórea de los bosques del estado de Nuevo León afectados por incendios forestales.

La divulgación de las investigaciones se ha diversificado con el paso del tiempo. Los trabajos más antiguos documentados en esta revisión corresponden a revistas internacionales como *Plant Ecology* (antes "Vegetatio"), tendencia que se mantuvo en la década de los noventa a excepción de tres artículos publicados en *Acta Botánica Mexicana*. Al parecer, la creación de nuevas revistas, la diversificación de los contenidos y su inclusión en índices como JCR (Journal Citation Reports), como el caso de la *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, ha permitido la apertura de los investigadores para publicar trabajos en revistas nacionales, aunado al predominio del idioma español en las mismas y quizás al compromiso de los investigadores mexicanos de publicar en revistas nacionales.

Con respecto al número de publicaciones, la tendencia ha sido ascendente en los últimos cinco años, lo cual puede reflejar un interés creciente en el tema. Aunque un análisis de las razones que han propiciado tal tendencia va más allá del objetivo de este trabajo, aparentemente, en parte, esto podría atribuirse a la vulnerabilidad antropogénica y climática a la que los

The ecosystem with a higher concentration of studies is the tropical deciduous forest (Annex 1). One of the possible reasons why this ecosystem arouses the interest of research scientists is perhaps its high diversity of species (Bullock & Solis-Magallanes, 1990). Most of the studies of the tropical deciduous forest have been carried out in Jalisco (11 studies), usually conducted by the Universidad Nacional Autónoma de México at the Estación Biológica Chamela, although this ecosystem has also been studied in other states of the country. This allows us to assume that, coincidentally, the studies have been spatially distributed according to their proximity to the area of influence of the research institutions. For example, Nuevo León is the entity with the highest number of studies, mostly carried out by research scientists from the Universidad Autónoma de Nuevo León, mainly conducted in the *Parque Ecológico Chipinque* and the Tamaulipan thornscrub.

The families with higher frequency in the literature are Fabaceae, Fagaceae and Pinaceae, which coincides with the high number of species belonging to these families (19,400, 670 and 220, respectively, according to <http://www.naturalista.mx/>), and wide distribution (Rzedowski, 1991). The Fabaceae family belongs to the leguminous (Fabales) group, the second most diverse group in Mexico (Sousa & Delgado, 1993), and has an important ecological and socioeconomic role in the different ecosystems (Estrada-Castillón et al., 2010). From this family, *A. farnesiana*, known in Mexico as huizache, is common in thornscrub forest (Miranda & Hernández-Xolocotzi, 1963); it has also been described as a species that can colonize disturbed areas (Estrada-Castillón & Martínez-Muñoz, 2000), making it the most abundant in the scrubs in the short term, after a disturbance.

The family Fagaceae is present practically all over the world and the genus *Quercus* is its most numerous genera with 161 species distributed in Mexico (Valencia, 2004). In the same way, the family Pinaceae is one of the most important ecologically and economically in Mexico (Rzedowski, 1991; Styles, 1993). The genus *Pinus* is the most widely distributed and is often the dominant component in temperate and cold ecosystems, which influence the ecosystem's functional processes, such as biogeochemical, hydrological, and fire regimes (Sánchez-González, 2008).

The family Burseraceae, characteristic of the tropical deciduous forest, is also subject matter in the studies, represented mainly by the genus *Bursera* (Miranda & Hernández-Xolocotzi, 1963); *B. simaruba* is the most frequently studied species (Figure 5). Rzedowski, Medina, and Calderón (2007) cite it as a widely distributed taxon in the American continent; however, these authors indicate that it is a plant whose morphological variation makes identification difficult.

ecosistemas forestales se someten (Weber, Bugmann, Fonti, & Rigling, 2008; Williams et al., 2013)(sin descartar su importancia económica y apoyos gubernamentales que motivan a mejorar el entendimiento de sus variables estructurales. Por otro lado, la consolidación de grupos de investigación en estos tópicos (Anexo 1) también pudo haber causado el número creciente de publicaciones. A nuestro saber, este es el primer esfuerzo que documenta los estudios a nivel nacional, en donde se analizan variables ecológicas estructurales de algunas especies arbóreas (Figuras 1, 3 y 4). Lo anterior dispone un punto de partida que brinda una síntesis del panorama de investigación de la ecología estructural de las comunidades vegetales y provee a los investigadores una perspectiva sobre el tema.

El ecosistema con mayor concentración de estudios es la selva baja caducifolia (Anexo 1). Una de las razones posibles por las que este ecosistema despierta el interés de los investigadores es quizás su alta diversidad de especies (Bullock & Solis-Magallanes, 1990). La mayor parte de trabajos de análisis de la selva baja caducifolia se ha realizado en Jalisco (11 estudios), conducidos usualmente por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Estación Biológica Chamela, aunque dicho ecosistema también se ha estudiado en otros estados del país. Esto permite inferir que, coincidentemente, los estudios se han distribuido espacialmente en función de su proximidad al área de influencia de las instituciones de investigación. Por ejemplo, Nuevo León es la entidad con mayor número de estudios, realizados en su mayoría por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, principalmente en el Parque Ecológico Chipinque y en el matorral espinoso tamaulipeco.

Las familias reportadas con mayor frecuencia en la literatura consultada son Fabaceae, Fagaceae y Pinaceae, lo cual coincide con el número elevado de especies pertenecientes a dichas familias (19,400, 670 y 220, respectivamente, según <http://www.naturalista.mx/>), así como por su amplia distribución (Rzedowski, 1991). La familia Fabaceae pertenece al grupo de las leguminosas (Fabales), segundo grupo más diverso en México (Sousa & Delgado, 1993), y tiene un papel ecológico y socioeconómico importante en los diferentes ecosistemas (Estrada-Castillón et al., 2010). De esta familia, *A. farnesiana*, conocida como huizache, es común en los matorrales espinosos (Miranda & Hernández-Xolocotzi, 1963); también se ha descrito como una especie que puede colonizar áreas de disturbio (Estrada-Castillón & Martínez-Muñoz, 2000), por lo que es la de mayor abundancia en los matorrales en el corto plazo, posterior a una perturbación.

La familia Fagaceae está presente prácticamente en todo el mundo y el género *Quercus* es su representante más numeroso con 161 especies distribuidas en

It is important to highlight that the studies carried out on species or plant communities with some category of risk in NOM-059-SEMARNAT-2010 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2010) appear rarely in the literature. Some species of temperate ecosystems, such as those of the genera *Abies* and *Picea* or species characteristic of mangroves, are scarcely published. This highlights the need to characterize the structure of these populations or communities to design management strategies for proper conservation. We do not discard additional efforts that delve into the description of structural attributes, quantification methods, types of research (descriptive, comparative or experimental research) of each publication, assessing the successional trajectories of plant communities in a temporal and spatial manner.

Conclusions

The species commonly studied belong to the genus *Quercus*, *Pinus*, *Acacia* and *Bursera*, and most studies focus on the tropical deciduous forest. This review represents the first effort to provide a perspective on the tree species that have been recorded more frequently in the Mexican scientific literature, with quantitative forest parameters. Therefore, the study contributes to the knowledge of plant communities and serves as a base of support for researchers in the subject matter. The increase in publications in recent years is evidence of growing interest in this area; however, it is important to highlight that the studies carried out for species or plant communities with some category of risk are rare in the literature.

Acknowledgments

This study was possible thanks to the financing of the CONACYT Project 222522. The authors wish to acknowledge the effort of anonymous reviewers, whose recommendations improved the version of the manuscript.

End of English version

Méjico (Valencia, 2004). De la misma manera, la familia Pinaceae es de las más importantes ecológica y económicamente en México (Rzedowski, 1991; Styles, 1993). El género *Pinus* es el de más amplia distribución y a menudo es el componente dominante en los ecosistemas templados y fríos, los cuales influyen en los procesos funcionales del ecosistema, tales como los ciclos biogeoquímicos, hidrológicos y los regímenes de fuego (Sánchez-González, 2008).

No menos importante, la familia Burseraceae, característica de la selva baja caducifolia, es también objeto de estudio en los trabajos analizados, representada principalmente por el género *Bursera* (Miranda & Hernández-Xolocotzi, 1963); *B. simaruba* es la especie reportada con mayor frecuencia (Figura 5). Rzedowski, Medina, y Calderón (2007) la reportan como un taxón con distribución amplia en el continente americano; no obstante, dichos autores indican que es una planta cuya variación morfológica hace difícil su identificación.

Es importante resaltar que los trabajos realizados para especies o comunidades vegetales con alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2010) tienen baja frecuencia en la literatura. Algunas especies de ecosistemas templados, tales como las de los géneros *Abies* y *Picea* o especies características de los manglares, son reportadas escasamente. Esto resalta la necesidad de caracterizar la estructura de estas poblaciones o comunidades para diseñar estrategias de manejo para su conservación adecuada. Tampoco se descartan esfuerzos adicionales que ahonden en la descripción de atributos estructurales, métodos de cuantificación, tipos de investigación (descriptiva, comparativa o experimental) de cada publicación, evaluando las trayectorias sucesionales de las comunidades vegetales de manera temporal y espacial.

Conclusiones

Las especies comúnmente estudiadas pertenecen a los géneros *Quercus*, *Pinus*, *Acacia* y *Bursera*, y la mayor cantidad de estudios se enfoca en la selva baja caducifolia. Esta revisión representa el primer esfuerzo para ofrecer una perspectiva acerca de las especies arbóreas que han sido documentadas con mayor frecuencia en la literatura científica mexicana, con parámetros forestales cuantitativos. Por ello, el estudio contribuye al conocimiento de las comunidades vegetales y sirve como una base de apoyo para los investigadores en el tema. El incremento de las publicaciones durante los últimos años es evidencia del interés creciente en este ámbito; sin embargo, es importante resaltar que los trabajos realizados para

References / Referencias

- Alanís-Rodríguez, E., Aguirre-Calderón, O., Jiménez-Pérez, J., Pando-Moreno, M., Treviño-Garza, E., Aranda-Ramos, R., & Canizales-Velázquez, P. (2010a). Efecto de la severidad del fuego sobre la regeneración asexual de especies leñosas de un ecosistema mixto (*Pinus-Quercus*) en el Parque Ecológico Chipinque, México. *Interciencia*, 35(9), 690–695. doi: 690 0378-1844/10/09/690-06
- Alanís-Rodríguez, E., Jiménez-Pérez, J., Espinoza-Vizcarra, D., Jurado-Ybarra, E., Aguirre-Calderón, O., & González-Tagle, M. (2008). Evaluación del estrato arbóreo en un área restaurada post-incendio en el Parque Ecológico Chipinque, México. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, 14(2), 113–118. Retrieved from https://chapingo.mx/revistas/forestales/contenido.php?id_revista_numero=38
- Alanís-Rodríguez, E., Jiménez-Pérez, J., Pando-Moreno, M., Aguirre-Calderón, O., Treviño-Garza, E., & Canizales-Velázquez, P. (2010b). Análisis de la diversidad arbórea en áreas restauradas post-incendio en el Parque Ecológico Chipinque, México. *Acta Biológica Colombiana*, 15(2), 309–324. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=319027885021>
- Alanís-Rodríguez, E., Jiménez-Pérez, J., Valdecantos-Dema, A., Aguirre-Calderón, O., & Treviño-Garza, E. (2011). Caracterización de regeneración leñosa post-incendio de un ecosistema templado del Parque Ecológico Chipinque, México. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*. doi: 10.5154/rchscfa.2010.05.032
- Arriaga, L., & León-de la Luz, J. (1989). The Mexican tropical deciduous forest of Baja California Sur : A floristic and structural approach. *Vegetatio*, 45–52. doi: 10.1007/BF00054664
- Balvanera, P., Lott, E., Segura, G., Siebe, C., & Islas, A. (2002). Patterns of β-diversity in a Mexican tropical dry forest. *Journal of Vegetation Science*, 13(2), 145–158. doi: 10.1111/j.1654-1103.2002.tb02034.x
- Bonan, G. B. (2008). Forests and climate change: Forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests. *Science*, 320(5882), 1444–1449. doi: 10.1126/science.1155121
- Bongers, F., Popma, J., Meave-Castillo, J., & Carabias, J. (1988). Structure and floristic composition of the lowland rain forest of Los Tuxtlas, Mexico. *Vegetatio*, 74(1), 55–80. doi: 10.1007/BF00045614
- Bullock, S. H., & Solis-Magallanes, J. A. (1990). Phenology of canopy trees of a tropical deciduous forest in Mexico. *Biotropica*, 22(1), 22–35. doi: 10.2307/2388716
- Castillo-Campos, G., Halffter, G., & Moreno, C. E. (2008). Primary and secondary vegetation patches as contributors to floristic diversity in a tropical deciduous forest landscape. *Biodiversity and Conservation*, 17(7), 1701–1714. doi: 10.1007/s10531-008-9375-7
- Clark, J. A., & Covey, K. R. (2012). Tree species richness and the logging of natural forests: A meta-analysis. *Forest* especies o comunidades vegetales con alguna categoría de riesgo tienen baja frecuencia en la literatura.
- Agradecimientos**
- Este trabajo fue posible gracias al financiamiento del Proyecto CONACYT 222522. Los autores desean reconocer el esfuerzo de revisores anónimos, cuyas sugerencias mejoraron la versión del manuscrito.

Fin de la versión en español

- Diversity and distributional patterns of legumes in Northeastern Mexico. *The Southwestern Naturalist*, 55(3), 426–433. doi: 10.1894/JB-13.1
- Estrada-Castillón, E., & Martínez-Muñoz, A. (2000). Legumes from the central part of the state of Chihuahua, Mexico. *SIDA, Contributions to Botany*, 19(2), 351–360. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41968944>
- Estrada, C. E., Yen, M. C., Delgado, S. A., & Villarreal, Q. J. (2004). Leguminosas del centro del estado de Nuevo León, México. *Anales del Instituto de Biología. Serie Botánica*, 75(1), 73–85. Retrieved from <http://www.ejournal.unam.mx/bot/075-01/BOT75105.pdf>
- García-Arévalo, A. (2008). Vegetación y flora de un bosque relictual de *Picea Chihuahuana* del norte de México. *Polibotánica*, 25, 45–68. Retrieved from <http://www.scielo.org.mx/pdf/polib/n25/n25a5.pdf>
- Gelviz-Gelvez, S., & Pavón-Hernández, N. (2013). Diversidad de especies arbustivas en una zona semiárida del centro de México. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, 19(3), 323–335. doi: 10.5154/r.rchscfa.2012.08.049
- González-Medrano, F. (2003). *Las comunidades vegetales de México. Propuesta para la unificación de la clasificación y nomenclatura de la vegetación de México*. México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales - Instituto Nacional de Ecología.
- Huerta-Martínez, F., & García-Moya, E. (2004). Diversidad de especies perennes y su relación con el ambiente en un área semiárida del centro de México: implicaciones para la conservación. *Interciencia*, 29(8), 435–441. Retrieved from http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442004000800008
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2015). Cartas de uso de suelo y vegetación. México. Retrieved January 11, 2017 from http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/usosuelo/Carta_suelo.aspx
- Lott, E., Bullock, S., & Solis-Magallanes, A. (1987). Floristic diversity and structure of upland and Arroyo Forests of Coastal Jalisco. *Biotropica*, 19(3), 228–235. doi: 10.2307/2388340
- Miranda, F., & Hernández-Xolocotzi, E. (1963). Los tipos de vegetación de México y su clasificación. *Boletín de la Sociedad Botánica de México*, 28, 20–179.
- Mora-Donjuán, C. A., Alanís-Rodríguez, E., Jiménez-Pérez, J., González-Tagle, M., Yerena-Yamallel, J. I., & Cuellar-Rodríguez, L. G. (2013). Estructura, composición florística y diversidad del matorral espinoso tamaulipeco, México. *Ecología Aplicada*, 12(1), 29–34. Retrieved from http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-22162013000100004&script=sci_arttext
- Ordóñez, J. A., & Masera, O. (2001). Captura de carbono ante el cambio climático. *Madera y Bosques*, 7(1), 3–12. Retrieved from <http://www.redalyc.org/pdf/6177/61770102.pdf>
- Popma, J., Bongers, F., & Meave-Castillo, J. (1988). Patterns in the vertical structure of the tropical lowland rain forest of Los Tuxtlas, Mexico. *Vegetatio*, 74(1), 81–91. doi: 10.1007/BF00045615
- Rzedowski, J. (1978). *Vegetación de México* (1ra. ed.). México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
- Rzedowski, J. (1991). El endemismo en la flora fanerogámica mexicana: una apreciación analítica preliminar. *Acta Botánica Mexicana*, 15, 47–64. Retrieved from <http://www.redalyc.org/pdf/574/57401505.pdf>
- Rzedowski, J., Medina, L. R., & Calderón, R. G. (2007). Segunda restauración de *Bursera ovalifolia* y nombre nuevo para otro componente del complejo de *B. simaruba* (Burseraceae). *Acta Botánica Mexicana*, 81, 45–70. Retrieved from <http://www.redalyc.org/pdf/574/57408104.pdf>
- Sánchez-González, A. (2008). Una visión actual de la diversidad y distribución de los pinos de México. *Madera y Bosques*, 14(1), 107–120.
- Sánchez-González, A., & López-Mata, L. (2003). Clasificación y ordenación de la vegetación del norte de la Sierra Nevada, a lo largo de un gradiente altitudinal. *Anales del Instituto de Biología. Serie Botánica*, 74(1), 47–71. Retrieved from <http://www.biblioteca.org.ar/libros/90684.pdf>
- Santibañez-Andrade, G., Castillo-Argüero, S., & Martínez-Orea, Y. (2015). Evaluación del estado de conservación de la vegetación de los bosques de una cuenca heterogénea del Valle de México. *Bosque*, 36(2), 299–313. doi: 10.4067/S0717-92002015000200015
- Sarukhán, J., Koleff, P., Carabias, J., Soberón, J., Dirzo, R., Llorente-Bousquets, J., ... De la Maza, J. (2009). *Capital natural de México: conocimiento actual, evaluación y perspectivas de sustentabilidad*. Síntesis. México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
- Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2010). Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. México: Diario Oficial de la Federación. Retrieved from www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/nom_059_semarnat_2010.pdf
- Sousa, S., & Delgado, S. (1993). Mexican Leguminosae: Phytogeography, endemism, and origins. In T. P. Ramamoorthy, R. Bye, A. Lot, & J. Fa (Eds.), *Biological diversity of Mexico: Origins and distribution* (pp. 459–511). New York: Oxford University Press.
- Styles, B. T. (1993). Genus *Pinus*: A Mexican purview. In T. P. Ramamoorthy, R. Bye, A. Lot, & J. Fa (Eds.), *Biological diversity of Mexico: Origin and distribution* (pp. 397–420). New York: Oxford University Press.
- Torres, R. J. M., & Guevara, S. A. (2002). El potencial de México para la producción de servicios ambientales: captura de carbono y desempeño hidráulico. *Gaceta Ecológica*, 63, 40–59. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53906303>
- Trejo, V. I. (1999). El clima de la selva baja caducifolia en México. *Investigaciones Geográficas*, 39, 40–52.

- Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56903903>
- Trejo, I., & Dirzo, R. (2002). Floristic diversity of Mexican seasonally dry tropical forests. *Biodiversity and Conservation*, 11(1), 2063–2084. doi: 10.1023/A:1020876316013
- Valencia, A. S. (2004). Diversidad del género *Quercus* (Fagaceae) en México. *Boletín de la Sociedad Botánica de México*, 75, 33–53. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57707503>
- Vázquez, N. I., López, P. D., Montalvo, U. H., Méndez, S. C., & Castillo, A. O. (2010). Estructura y composición florística de vegetación inundable en la División Académica de Ciencias Biológicas, Villahermosa, Tabasco. *Kuxulkab'*, 17(31), 21–30. Retrieved from <http://www.revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab/article/view/395/316>
- Weber, P., Bugmann, H., Fonti, P., & Rigling, A. (2008). Using a retrospective dynamic competition index to reconstruct forest succession. *Forest Ecology and Management*, 254(1), 96–106. doi: 10.1016/j.foreco.2007.07.031
- Williams, P. A., Allen, C. D., Macalady, A. K., Griffin, D., Woodhouse, C. A., Meko, D. M., ... McDowell, N. G. (2013). Temperature as a potent driver of regional forest drought stress and tree mortality. *Nature Climate Change*, 3(3), 292–297. doi: 10.1038/nclimate1693

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically.
Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente.

| References/Referencias | Journal/Revista | Ecosystem/Ecosistema | State/Entidad | Family/Familia | Genus/Género | Species/Especie |
|---|-------------------------|--|---------------------|--|--|---|
| Lott, Bullock, and Solis-Magallanes (1987) | Biotropica | Semi-evergreen seasonal forest and tropical rain forest/ Selva mediana caducifolia y selva alta subperennifolia | Jalisco | Fabaceae, Boraginaceae and Meliaceae | <i>Caesalpinia</i> , <i>Cordia</i> and <i>Trichilia</i> | <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken, <i>Caesalpinia eriostachys</i> Benth. and <i>Trichilia trifolia</i> L. |
| Bongers, Popma, Meave-Castillo, and Carabias (1988) | Vegetatio | Tropical rain forest/ Selva alta perennifolia | Chiapas | Arecaceae, Moraceae and Lauraceae | <i>Astrocaryum</i> , <i>Pseudolmedia</i> and <i>Nectandra</i> | <i>Astrocaryum mexicanum</i> Liebm. ex Mart., <i>Pseudolmedia oxyphyllaria</i> Donn. Sm. and <i>Nectandra ambigens</i> (S. F. Blake) C. K. Allen |
| Popma, Bongers, and Meave-Castillo (1988) | Vegetatio | Tropical rain forest / Selva alta perennifolia | Chiapas | Arecaceae, Lauraceae and Moraceae | <i>Astrocaryum</i> , <i>Nectandra</i> and <i>Pseudolmedia</i> | <i>Astrocaryum mexicanum</i> Liebm. ex Mart., <i>Pseudolmedia oxyphyllaria</i> Donn. Sm. and <i>Nectandra ambigens</i> (Blake) C. K. Allen. |
| Arriaga and León-de la Luz (1989) | Vegetatio | Tropical deciduous forest / Selva baja caducifolia | Baja California Sur | Fabaceae, Burseraceae and Anacardiaceae | <i>Opuntia</i> , <i>Indigofera</i> , <i>Bursera</i> and <i>Cyrtocarpa</i> | <i>Bursera microphylla</i> A. Gray, <i>Cyrtocarpa edulis</i> (Brandegee) Strandl. e <i>Indigofera fruticosa</i> Rose. |
| García-Arévalo and González-Elizondo (1991) | Acta Botánica Mexicana | Pinewood forest/ Matorral de coníferas | Nuevo León | Pinaceae | <i>Pinus</i> | <i>Pinus culminicola</i> Andresen and Beaman |
| Martíjena and Bullock (1994) | Journal of Biogeography | Tropical deciduous forest / Selva baja caducifolia | Jalisco | Euphorbiaceae | <i>Celaenodendron</i> | <i>Celaenodendron mexicanum</i> Standley |
| Durán-García (1995) | Acta Botánica Mexicana | Petenes | Campeche | Acanthaceae, Rhizophoraceae and Arecaceae | <i>Bravaisia</i> , <i>Rhizophora</i> and <i>Sabal</i> | <i>Sabal yapa</i> L., <i>Bravaisia tubiflora</i> Hemsley and <i>Rhizophora mangle</i> L. |
| Valiente-Banuet, González, and Piñero (1995) | Acta Botánica Mexicana | Seasonal evergreen forest, Gallery forest, Tropical deciduous forest, Semi-evergreen seasonal forest and Seasonal evergreen forest / Selva mediana subperennifolia, bosque de galería, selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia y selva mediana perennifolia | Tamaulipas | Taxodiaceae, Malvaceae, Moraceae and Burseraceae | <i>Taxodium</i> , <i>Pseudobombax</i> , <i>Brosimum</i> and <i>Bursera</i> | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg., <i>Taxodium mucronatum</i> Ten., <i>Brosimum allicastrum</i> Swarts and <i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)
Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References/Referencias | Journal/Revista | Ecosystem/Ecosistema | State/Entidad | Family/Familia | Genus/Género | Species/Especie |
|---|---|--|---------------|-----------------------------|---|--|
| Perkulis, Ramos-Prado, and Jiménez-Osornio (1997) | Forest Ecology and Management | Tropical deciduous forest/Selva baja caducifolia | Yucatán | Boraginaceae | Cordia | <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Cham. |
| Miller and Kauffman (1998) | Forest Ecology and Management | Tropical deciduous forest/Selva baja caducifolia | Jalisco | Fabaceae and Boraginaceae | Pipradenia and Cordia | <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Cham, and <i>Pipradenia constricta</i> (Micheli & Rose ex Michel) J. F. Macbr. |
| Hernández-Vargas, Sánchez-Yélásquez, Carnona-Valdovinos, and Cuevas-Guzmán (2000) | Madera y Bosques | Pine-oak, Gallery forest, Cloud forest and Pine forest/Pino-encino, bosque de galería, bosque mesófilo de montaña y bosque de pino | Jalisco | Rosaceae and Pinaceae | <i>Pinus douglasiana</i> Martinez and <i>Prunus serotina</i> Ehrh. | |
| Jiménez-Pérez, Aguirre-Calderón, and Kramer (2001) | Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales | Pine-oak/Pino-encino | Nuevo León | Pinaceae | <i>Pinus pseudostrobus</i> Gordon & Glend | |
| Treviño-Garza, Cavazos-Camacho, and Aguirre-Calderón (2001) | Madera y Bosques | Gallery forest/Bosque de galería | Nuevo León | Taxodiaceae and Platanaceae | <i>Taxodium mucronatum</i> Ten. and <i>Platanus occidentalis</i> L. | |
| Ceccon, Olmsted, Vázquez-Yanes, and Campo-Alves (2002) | Agrociencia | Tropical deciduous forest/Selva baja caducifolia | Yucatán | Fabaceae | Lysiloma and <i>Pithecellobium</i> | <i>Lysiloma latisiliquum</i> (L.) Benth. and <i>Pithecellobium dulce</i> Benth |
| Contral-Rivas, Aguirre-Calderón, Jiménez-Pérez, and Návar-Cháidez (2002) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Cloud forest/Bosque mesófilo de montaña | Tamaulipas | Altingiaceae | <i>Liquidambar</i> | <i>Liquidambar styraciflua</i> L. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)

Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|---|---|--|--|--|--|---|
| Díaz-Gallegos, Castillo-Acosta, and García-Gil (2002) | Universidad y Ciencia | Thorn forest/ Selva baja subperennifolia | Campeche | Myrtaceae | Myrciaria | <i>Myrciaria floribunda</i> (H. West ex Willdenow) O. Berg |
| Sánchez-Velásquez et al. (2002) | Polibotánica | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Jalisco | Moraceae | Brosimum | <i>Brosimum allicastrum</i> Sw. |
| Godínez-Ibarra and López-Mata (2002) | Anales del Instituto de Biología. Serie Botánica | Seasonal evergreen forest/ Selva mediana subperennifolia | Veracruz | Apocynaceae and Burseraceae | Tabernaemontana, Bursera | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg. and <i>Tabernaemontana alba</i> Mill. |
| González-Iturbe, Olmsted, and Tun-Dzul (2002) | Forest Ecology and Management | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Yucatán | Fabaceae, Apocynaceae and Boraginaceae | Apoplanesia, Plumeria and Cordia | <i>Apoplanesia paniculata</i> C. Presl, <i>Cordia gerasanthus</i> (P. Browne) Cham and <i>Plumeria rubra</i> L. |
| Trejo and Dirzo (2002) | Biodiversity and Conservation | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas and Yucatán | Apocynaceae and Euphorbiaceae | Plumeria and Euphorbia | <i>Euphorbia schlechtendalii</i> Boiss. and <i>Plumeria rubra</i> L. |
| Williams-Linera (2002) | Biodiversity and Conservation | Cloud forest/ Bosque mesófilo de montaña | Veracruz | Fabaceae and Altingiaceae | Turpinia and Liquidambar | <i>Liquidambar styraciflua</i> L. and <i>Turpinia insignis</i> Vent. |
| Balvanera, Lott, Segura, Siebe, and Islas (2002) | Journal of Vegetation Science | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Jalisco | Fabaceae and Nyctaginaceae | Caesalpinia and Guapira | <i>Caesalpinia eriostachys</i> Benth and <i>Guapira macrocarpa</i> Miranda |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)

Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|--|--|--|------------------|--|--|---|
| Catalán-Heverástico, López-Mata, & Terrazas (2003) | Anales del Instituto de Biología. Serie Botánica | Cloud forest/Bosque mesófilo de montaña | Guanajuato | Malvaceae | Chiranthodendron pentadactylon | <i>Chiranthodendron pentadactylon</i> Latrengui |
| Enriquez-Enriquez, Koch, and González-Elizondo (2003) | Acta Botánica Mexicana | Pine-oak, Pine forest, Oak forest, Táscate forest and Natural grassland vegetation / Pino-encino, bosque de pino, bosque de encino, bosque de táscate y pastizal natural | Zacatecas | Fagaceae and Pinaceae/ Fagaceae y Pinaceae | Quercus and Pinus | <i>Pinus cembroides</i> Zucc. and <i>Quercus grisea</i> Liemb. |
| Sánchez-Rodríguez, López-Mata, García-Moya, and Cuevas-Guzmán (2003) | Boletín de la Sociedad Botánica de México | Cloud forest/Bosque mesófilo de montaña | Jalisco | Styracaceae | Styrax | <i>Styrax radians</i> P. W. Fritsch |
| Sánchez-González and López-Mata (2003) | Anales del Instituto de Biología. Serie Botánica | Pine-oak, pine forest, Abies forest, Natural grassland vegetation / Pino-encino, bosque de pino, bosque de Abies, pastizal natural | Estado de México | Pinaceae and Fagaceae | Pinus, Quercus and Abies | <i>Abies religiosa</i> (Kunth Schlehd. et Cham.), <i>Quercus laurina</i> Bonpl., <i>Q. rugosa</i> Née and <i>Pinus hartwegii</i> Lindl. |
| Segura, Balyanera, Durán, and Pérez (2003) | Plant Ecology | Tropical deciduous forest / Selva baja caducifolia | Jalisco | Euphorbiaceae and Apocynaceae | Celaenodendron and Plumeria | <i>Plumeria rubra</i> L. and <i>Celaenodendron mexicanum</i> Standley |
| Peña-Ramírez and Bonfil (2003) | Boletín de la Sociedad Botánica de México | Oak forest/Bosque de encino | Guanajuato | Fagaceae | Quercus | <i>Quercus liebmannii</i> Oerst. ex Trél. and <i>Q. magnoliifolia</i> Née. |
| Aguirre-Calderón, Hui, von Gadow, and Jiménez-Pérez (2003) | Forest Ecology and Management | Pine forest/Bosque de pino | Durango | Pinaceae | Abies, <i>Pseudotsuga</i> and <i>Picea</i> | <i>Picea chihuahuana</i> Martínez., <i>Abies durangensis</i> Martínez and <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)
Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|--|---|--|--------------------------|------------------------------------|---|---|
| Foroughbakch, Alvarado-Vázquez, Núñez-González, Hernández-Piñero, and Rocha-Estrada (2003) | Interciencia | Tamaulipan thornscrub / Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Rutaceae | Helietta | <i>Helietta parvifolia</i> (Gray) Benth |
| Foroughbakch, Céspedes, Alvarado-Vázquez, Núñez-González, and Badii (2004) | Ciencia UANL | Mangroves / Manglares | Tamaulipas | Combretaceae | Laguncularia | <i>Laguncularia racemosa</i> (L.) Gaertn. |
| Pérez-García and Meave-Castillo (2004) | Plant Ecology | Tropical deciduous forest / Selva baja caducifolia | Oaxaca | Apocynaceae | Plumeria | <i>Plumeria rubra</i> L. |
| White and Hood (2004) | Journal of Vegetation Science | Tropical deciduous forest / Selva baja caducifolia | Quintana Roo and Yucatán | Moraceae, Burseraceae and Fabaceae | Brosimum, Bursera and Caesalpinia | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg., <i>Caesalpinia gaumeri</i> Greenm. and <i>Brosimum alicastrum</i> Sw. |
| Burgos and Mass (2004) | Agriculture, Ecosystems and Environment | Tropical deciduous forest / Selva baja caducifolia | Jalisco | Fabaceae | Acacia and Mimosa | <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd and <i>Mimosa arenosa</i> (Willd.) Poir. |
| Corral-Rivas, Jiménez-Pérez, Aguirre-Calderón, and Corral-Rivas (2005) | Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales | Cloud forest / Bosque mesófilo de montaña | Tamaulipas | Fagaceae, Betulaceae and Alticeae | <i>Quercus</i> , <i>Ostrya</i> and <i>Liquidambar</i> | <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Quercus sartorii</i> Liebm. and <i>Ostrya virginiana</i> (Mill.) K |
| Estrada-Castillón, Yen-Méndez, Delgado-Salinas, and Villarreal-Quintanilla (2004) | Anales del Instituto de Biología. Serie Botánica | Tamaulipan thornscrub, Submontane scrub and Mezquital xerophilous vegetation / Matorral espinoso tamaulipeco, matorral submontano y mezquital xerófilo | Nuevo León | Fabaceae | Acacia | <i>Acacia</i> sp. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)
Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|--|---|--|-----------------|--|--|---|
| Gallardo-Cruz, Meave-Castillo, and Pérez-García (2005) | Boletín de la Sociedad Botánica de México | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Oaxaca | Burseraceae | Bursera | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg, |
| Williams-Linera, Palacios-Ríos, and Hernández-Gómez (2005) | Biodiversity and Conservation | Cloud forest/ Bosque mesófilo de montaña | Veracruz | Fagaceae | Fagus | <i>Fagus grandifolia</i> Ehrh. |
| Solís-Moreno et al. (2006) | Madera y Bosques | Pine forest/Bosque de pino | Durango | Pinaceae | Pinus | <i>Pinus leiophylla</i> Schiede ex Schltdl. & Cham. |
| Basáñez, Olmedo, and Rojas, (2006) | Revista Científica UDO Agrícola | Mangroves/Manglares | Veracruz | Acanthaceae | Avicennia | <i>Avicennia germinans</i> (L.) Stearn. |
| Durán, Meave-Castillo, Lot, and Segura (2006) | Boletín de la Sociedad Botánica de México | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Jalisco | Fabaceae | Caesalpinia | <i>Caesalpinia eriostachys</i> Benth. |
| Romero-Duque, Jaramillo, and Pérez-Jiménez (2007) | Forest Ecology and Management | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Jalisco | Fabaceae | Mimosa | <i>Mimosa arenosa</i> (Willd.) Poir. |
| Salgado-Mora, Ibarra-Núñez, Macías-Sámano, and López-Báez (2007) | Interciencia | Seasonal evergreen forest/ Selva mediana perennifolia | Chiapas | Anacardiaceae, Fabaceae and Boraginaceae | Mangifera, Gliricidia and Cordia | <i>Mangifera indica</i> L., <i>Gliricidia sepium</i> Kunth ex Steud. and <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Cham. |
| Sánchez-Mejía et al. (2007) | Revista Latinoamericana de Recursos Naturales | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Sonora | Fabaceae | Prosopis | <i>Prosopis glandulosa</i> Torr. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)
Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|---|---|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Encina-Domínguez, Zárate-Lupercio, Valdes- Reyna, and Villarreal- Quintanilla (2007) | Boletín de la Sociedad Botánica de México | Oak forest/Bosque de encino | Coahuila | Fagaceae | Quercus | <i>Quercus laeta</i> Liebm., <i>Q. greggii</i> (A. DC.) Trel., <i>Q. mexicana</i> Humb. & Bonpl. and <i>Q. saltillensis</i> Trel. |
| López and Dirzo (2007) | Biodiversity and Conservation | Seasonal evergreen forest, Semi-evergreen seasonal forest, Seasonal evergreen forest/ Selva mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva mediana perennifolia | Veracruz | Arecaceae | Sabal | <i>Sabal mexicana</i> Mart. |
| González, Schwendemann, Jiménez, and Himmelsbach (2007) | Madera y Bosques | Pine-oak/Pino-encino | Nuevo León | Fagaceae | Quercus | <i>Quercus rysophylla</i> Weath. |
| Pineda-García, Arredondo- Amezcuá, and Ibarra- Manríquez (2007) | Revista Mexicana de Biodiversidad | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Guerrero | Boraginaceae and Burseraceae | Cordia and <i>Bursera</i> | <i>Bursera</i> sp. (L.) Sarg. and <i>Cordia elaeagnoides</i> A. DC. |
| Suzán-Azpiri, Enríquez- Peña, and Maldá- Barrera (2007) | Forest Ecology and Management | Gallery forest/ Bosque de galería | Querétaro | Taxodiaceae | Taxodium | <i>Taxodium mucronatum</i> Ten. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)**Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)**

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|---|---|---|-----------------|---|--|---|
| Alanís-Rodríguez et al. (2008 ^a) | Ciencia UANL | Tamaulipan thornscrub/ Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Fabaceae, Euphorbiaceae and Ebenaceae | Acacia, <i>Bernardia</i> and <i>Diospyros</i> | <i>Bernardia myricaefolia</i> (Scheele) <i>S. Wats.</i> , <i>Diospyros texana</i> Scheele, <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd and <i>A. rigidula</i> Benth. |
| Alanís-Rodríguez et al. (2008b) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Pine-oak / Pino-encino | Nuevo León | Fagaceae | Quercus | <i>Quercus myrsophylla</i> Weath. |
| Álvarez-Yépez, Martínez-Yrízar, Búrquez, and Lindquist (2008) | Forest Ecology and Management | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Sonora | Fabaceae | Acacia | <i>Acacia cochliacantha</i> Willd. |
| Basáñez-Muñoz, Alanís, and Badillo (2008) | Avances en Investigación Agropecuaria | Seasonal evergreen forest/ Selva mediana subperennifolia | Veracruz | Tiliaceae | <i>Heliocarpus</i> | <i>Heliocarpus microcarpus</i> Rose |
| Castellanos-Bolaños et al. (2008) | Madera y Bosques | Pine forest / Bosque de pino | Oaxaca | Pinaceae | <i>Pinus</i> | <i>Pinus patula</i> Schltdl. & Cham. |
| Encina-Domínguez, Encina-Domínguez, Mata-Rocha, and Valdes-Reyna (2008) | Boletín de la Sociedad Botánica de México | Abies forest / Bosque de Abies | Coahuila | Pinaceae | <i>Abies</i> | <i>Abies vejarii</i> Martínez |
| García-Arévalo (2008) | Polibotánica | Ayarán forest / Bosque de ayarín | Durango | Pinaceae and Cupresaceae | Picea and Cupressus | <i>Picea chihuahuana</i> Martínez and <i>Cupressus lusitanica</i> Mill. |
| García-Hernández and Jurado-Ybarra (2008) | Ra Ximhai | Tamaulipan thornscrub / Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Rutaceae | Helietta | <i>Helietta parvifolia</i> (Gray) Benth. |
| Roncal-García, Soto-Pinto, Castellanos-Albores, Ramírez-Marcial, and De Jong (2008) | Interciencia | Cloud forest and Seasonal evergreen forest / Bosque mesófilo de montaña y selva mediana perennifolia | Chiapas | Tiliaceae | <i>Heliocarpus</i> | <i>Heliocarpus appendiculatus</i> Turcz |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)
Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|---|--|---|-----------------|--|---|---|
| Tun-Dzul, Vester, Durán-García, and Schmook (2008) | Polibotánica | Seasonal evergreen forest, Semi-evergreen seasonal forest and / Selva mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia y selva mediana subaducifolia | Yucatán | Fabaceae, Euphorbiaceae | Haematoxylum and Croton | <i>Haematoxylum campechianum</i> L. and <i>Croton nitens</i> Sw. |
| Zamora-Crescencio, García-Gil, Flores-Guido, and Javier-Ortiz (2008) | Polibotánica | Semi-evergreen seasonal forest/ Selva mediana subaducifolia | Yucatán | Fabaceae and Euphorbiaceae/ Fabaceae y Euphorbiaceae | Lysiloma and Gymnanthes | <i>Lysiloma latisiliquum</i> (L.) Benth. and <i>Gymnanthes lucida</i> Sw. |
| González-Tagle, Schwendemann, Jiménez-Pérez, and Schulz (2008) | Forest Ecology and Management | Pine-oak / Pino-encino | Nuevo León | Pinaceae and Fagaceae | <i>Pinus</i> and <i>Quercus</i> | <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl., <i>Quercus rysophylla</i> Weath. and <i>P. tecote</i> Schltdl. & Cham. |
| Canizales-Velázquez et al. (2009) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Submontane scrub/ Matorral submontano | Nuevo León | Fabaceae | Acacia | <i>Acacia berlandieri</i> Benth. |
| Flores-Palacios, Martínez- Gómez, and Curry (2009) | Boletín de la Sociedad Botánica de México | Cloud forest, Tropical deciduous forest, Thorn forest / Bosque mesófilo de montaña, selva baja perennifolia selva baja caducifolia, selva baja perennifolia | Colima | Sapotaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, Aquiloliaceae and Moraceae | <i>Sideroxylon</i> , <i>Ficus</i> , <i>Hippomane</i> , <i>Ilex</i> , and <i>Psidium</i> | <i>Sideroxylon socorrense</i> (Brandegees) T. D. Penn., <i>Ficus</i> <i>cotinifolia</i> Kunth, <i>Hippomane</i> <i>mancinella</i> L., <i>Ilex socorroensis</i> Brandegees and <i>Psidium</i> <i>socorrense</i> I. M. Johnston. |
| Jiménez-Pérez, Alanís- Rodríguez, Aguirre- Calderón, Pando-Moreno, and González-Tagle (2009) | Madera y Bosques | Tamaulipan thornscrub / Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Fabaceae, Ebenaceae and Euphorbiaceae | <i>Acacia</i> , <i>Diospyros</i> and <i>Bernardia</i> | <i>Bernardia myricaefolia</i> (Scheele) S. Watson, <i>Diospyros texana</i> Scheele, and <i>Acacia rigidula</i> Benth. |
| Martínez-Cruz, Téllez Valdés, and Ibarra- Manríquez (2009) | Revista Mexicana de Biodiversidad | Oak forest/ Bosque de encino | Guanajuato | Fagaceae | <i>Quercus</i> | <i>Quercus potosina</i> Trdl., <i>Q. castanea</i> Née and <i>Q. eduardii</i> Trdl. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)
Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|---|-------------------------------|--|---------------------|--|---|---|
| Návar-Cháidez and González-Elizondo (2009) | Polibotánica | Pine forest/ Bosque de pino | Durango | Pinaceae | Pinus | <i>Pinus cooperi</i> Blanco |
| Rendón-Carmona, Martínez-Yrízar, Balvanera, and Pérez-Salicrup (2009) | Forest Ecology and Management | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Jalisco | Euphorbiaceae | Croton | <i>Croton septentrivius</i> McVaugh |
| Williams-Linera and Lorea (2009) | Biodiversity and Conservation | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Veracruz | Burseraceae, Bignoniaceae and Convolvulaceae | Bursera, <i>Tabebuia</i> e <i>Ipomea</i> | <i>Bursera cinerea</i> Engl., <i>Ipomea volcottiana</i> Rose and <i>Tabebuia chrysanthfa</i> (Jacq.) Nicholson. |
| Arriaga-Cabrera (2009) | Investigación Ambiental | Mezquital xerophilous vegetation/ Mezquital xerófilo | Baja California Sur | Burseraceae | Bursera | <i>Bursera microphylla</i> A. Gray |
| Roa-Romero, Salgado-Mora, and Alvarez-Herrera (2009) | Acta Biológica Colombiana | Seasonal evergreen forest/ Selva mediana perennifolia | Chiapas | Sapotaceae and Anacardiaceae | Pouteria and <i>Mangifera</i> | <i>Mangifera indica</i> L. and <i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) H. E. Moore & Stearn. |
| Alanís-Rodríguez et al. (2010 ^a) | Interciencia | Pine-oak/Pino-encino | Nuevo León | Fagaceae, Pinaceae | Quercus and <i>Pinus</i> | <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl. and <i>Quercus polymorpha</i> Cham. & Schltdl. |
| Alanís-Rodríguez et al. (2010b) | Ciencia UANL | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | San Luis Potosí | Burseraceae and Bignoniaceae | Bursera and <i>Tabebuia</i> | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg. and <i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) DC. |
| Alanís-Rodríguez et al. (2010c) | Acta Biológica Colombiana | Pine-oak/Pino-encino | Nuevo León | Fagaceae | Quercus | <i>Quercus rysophylla</i> Weath. |
| Alanís-Rodríguez et al. (2010d) | Madera y Bosques | Pine-oak/Pino-encino | Nuevo León | Fagaceae | Quercus | <i>Quercus rysophylla</i> Weath. |
| Canizales-Velázquez et al. (2010) | Ciencia UANL | Gallery forest/ Bosque de galería | Nuevo León | Taxodiaceae | Taxodium | <i>Taxodium mucronatum</i> Ten. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)

Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|--|---|--|-----------------|--------------------------|--|---|
| Castellanos-Bolaños, Treviño-Garza, Aguirre-Calderón, Jiménez-Pérez, and Velázquez-Martínez (2010) | Revista Mexicana de Ciencias Forestales | Pine-oak/Pino-encino | Oaxaca | Pinaceae | Pinus | <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl., <i>P. patula</i> Schltdl. et Cham., <i>P. oaxacana</i> Mirov, <i>P. douglasiana</i> Martínez, <i>P. ayacahuite</i> Ehrenb. ex Schltdl., <i>P. tecote</i> Schiede ex Schltdl. et Cham. and <i>P. leiophylla</i> Schiede ex Schltdl. & Cham. |
| González-Rodríguez, Ramírez-Lozano, Cantú-Silva, Gómez-Meza, and Uvalle-Sauceda (2010) | Polibotánica | Tamaulipan thornscrub /Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Fabaceae | Acacia | <i>Acacia rigidula</i> Benth. |
| Leyva-López, Velázquez-Martínez, and Ángeles-Pérez (2010) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Pine forest/ Bosque de pino | Oaxaca | Pinaceae | Pinus | <i>Pinus pseudostrobus</i> Gordon & Glend., <i>P. douglasiana</i> Martínez Pérez (2010) |
| Maldonado-Sánchez and Maldonado-Mares (2010) | Universidad y Ciencia | Tropical rain forest/ Selva alta perennifolia | Tabasco | Anacardiaceae | Spondias | <i>Spondias mombin</i> L. |
| Poulos and Camp (2010) | Ecology | Pine-Oak/ Encino-pino | Coahuila | Cupresaceae and Pinaceae | Juniperus and Pinus | <i>Juniperus deppeana</i> Steud. and <i>Pinus ponderosa</i> P. Lawson & C. Lawson |
| Torres, Méndez, Dorantes, and Durán (2010) | Boletín de la Sociedad Botánica de México | Vegetation of coastal dunes/ Duna costera | Yucatán | Fabaceae and Arecaceae | Pithecellobium and Coccothrinax radii H. J. Quero. | <i>Pithecellobium keyense</i> Britton ex Coker and <i>Coccothrinax radii</i> H. J. Quero. |
| Vázquez-Negrín, López-Pérez, Montalvo-Urgel, Méndez-Sánchez, and Castillo-Acosta (2010) | Kuxulkab' | Thorn forest/ Selva baja perennifolia | Tabasco | Apocynaceae | Tabernaemontana chrysocarpa | <i>S. F. Blake.</i> |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)
Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|---|---|--|---------------------|--|--|--|
| Zacarías-Eslava and Del Castillo | Boletín de la Sociedad Botánica de México | Pine-Oak/Encino-pino | Oaxaca | Fagaceae and Pinaceae | Pinus and <i>Pinus</i> | <i>Pinus pseudostrobus</i> Gordon & Glend., <i>Q. laurina</i> Bonpl., <i>Q. glaucoidea</i> M. Martens & Galeotti and <i>Q. obtusata</i> Bonpl. |
| Zarco-Espinosa, Valdez-Hernández, Ángeles-Pérez, and Castillo-Acosta (2010) | Universidad y Ciencia | Seasonal evergreen forest/ Selva mediana perennifolia | Tabasco | Arecaceae and Violaceae | Astrocaryum and <i>Rinorea</i> | <i>Astrocaryum mexicanum</i> Liebm. ex Mart. and <i>Rinorea guatemalensis</i> (S. Watson) Bartlett. |
| Reich, Bonham, Aguirre-Bravo, and Chazarro-Basañez (2010) | Plant Ecology | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Jalisco | Pinaceae, Moraceae, Fabaceae, Burseraceae and Fagaceae | <i>Pinus</i> , <i>Ficus</i> , <i>Gaesalpinia</i> , <i>Bursera</i> and <i>Quercus</i> | <i>Bursera</i> sp., <i>Quercus</i> sp., <i>Pinus</i> sp., <i>Ficus</i> sp. and <i>Gaesalpinia</i> sp. |
| Velderrain-Algara, León-De la Luz, and Maya-Delgado (2010) | Polibotánica | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Baja California Sur | Euphorbiaceae | <i>Jatropha</i> | <i>Jatropha cuneata</i> Wiggins & Rollins and <i>J. cinerea</i> (Ortega) Muell. Arg |
| Alanís-Rodríguez, Jiménez-Pérez, Valdecantos-Dema, Aguirre-Calderón, and Treviño-Garza (2011) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Pine-oak/Pino-encino | Nuevo León | Fagaceae | <i>Quercus</i> | <i>Quercus polymorpha</i> Cham. & Schltdl. |
| Canizales-Vélazquez et al. (2011) | Ciencia UANL | Pine-Oak/Pino-encino | Nuevo León | Lauraceae | <i>Litsea</i> | <i>Litsea pringlei</i> Bartlett. |
| Cuevas-Guzmán et al. (2011) | Revista Mexicana de Biodiversidad | Abies forest/Bosque de Abies | Jalisco | Pinaceae | <i>Abies</i> | <i>Abies religiosa</i> (Kunth) Schltdl. et Cham. |
| Gutiérrez-Báez et al. (2011) | Forestal Veracruzana | Semi-evergreen seasonal forest/ Selva mediana subcaducifolia | Yucatán | Fabaceae | <i>Lysiloma</i> | <i>Lysiloma latisiliquum</i> (L.) Benth. |
| Palomeque et al. (2011) | Kuxulkab' | Tropical deciduous forest and Deciduous forest/ Selva baja caducifolia y selva mediana caducifolia | Tabasco | Fabaceae | <i>Haematoxylum</i> | <i>Haematoxylum campechianum</i> L. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)
Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|--|---|---|------------------|--------------------------------|---|--|
| Rubio-Licona, Romero-Rangel, and Rojas-Zenteno (2011) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Oak forest/ Bosque de encino | Estado de México | Fagaceae | Quercus | <i>Quercus crassifolia</i> Humb. & Bonpl., and <i>Q. candicans</i> Née |
| Vargas-Rodríguez (2011) | Acta Botánica Mexicana | Cloud forest / Bosque mesófilo de montaña | Guerrero | Sapindaceae | Acer | <i>Acer saccharum</i> Marshall. |
| Vázquez-Negrín, Castillo-Acosta, Valdez-Hernández, Zavala-Cruz, and Martínez-Sánchez (2011) | Polibotánica | Tropical rain forest/ Selva alta perennifolia | Tabasco | Violaceae | Rinorea | <i>Rinorea guatemalensis</i> (S. Watson) Bartlett |
| Williams-Linera, Alvarez-Aquino, Hernández-Ascención, and Toledo (2011) | New Forests | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Veracruz | Fabaceae, Malvaceae | Acacia and Guazuma | <i>Acacia cochliacantha</i> S. Watson, <i>Guazuma ulmifolia</i> Lam. and <i>A. cornigera</i> (L.) Willd. |
| Zacarias-Eslava, Cornejo-Tenorio, Cortés-Flores, González-Castañeda, e Ibarra-Manríquez (2011) | Revista Mexicana de Biodiversidad | Oak forest/ Bosque de encino | Michoacán | Convolvulaceae and Fagaceae | <i>Ipomoea</i> and <i>Quercus</i> | <i>Quercus laurina</i> Bonpl., <i>Q. castanea</i> Née, <i>Q. rigosa</i> Née e <i>Ipomoea mururoides</i> Roem. & Schult. |
| Zamora-Crescencio et al. (2011) | Boletín de la Sociedad Botánica de México | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Camppeche | Boraginaceae | <i>Cordia</i> | <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Cham. |
| Hernández-Silva et al. (2011) | Acta Zoológica Mexicana | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Morelos | Euphorbiaceae and Fabaceae | <i>Euphorbia</i> and <i>Lysiloma</i> | <i>Euphorbia schlechtendalii</i> Boiss. and <i>Lysiloma divaricata</i> (Jacq.) J. F. Macbr. |
| Linzaga-Román, Ángeles-Pérez, Catalán-Heverástico, and Hernández-de la Rosa (2011) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Tropical deciduous forest /Selva baja caducifolia | Guerrero | Fabaceae | <i>Acacia</i> | <i>Acacia tenuifolia</i> (L.) Willd. |
| Alanís-Rodríguez et al. (2012) | Revista Mexicana de Biodiversidad | Pine-oak / Pino-encino | Nuevo León | Fagaceae | Quercus | <i>Quercusrysophylla</i> Weath. |
| Estrada-Castillón et al. (2012) | Botanical Sciences | Submontane scrub/ Matorral submontano | Nuevo León | Rutaceae | <i>Helietta</i> | <i>Helietta parvifolia</i> (Gray) Benth. |
| Gutiérrez-Báez, Ortiz-Díaz, Flores-Guido, and Zamora-Crescencio (2012) | Polibotánica | Semi-evergreen seasonal forest / Selva mediana subcaducifolia | Yucatán | Fabaceae | <i>Caesalpinia</i> | <i>Caesalpinia gaumeri</i> (Greenm.) Britton & Rose |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)**Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)**

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|--|---|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Gutiérrez-Báez, Zamora-Crescencio, and Hernández-Mundo (2012) | Forestal Veracruzana | Semi-evergreen seasonal forest/ Selva mediana subcaducifolia | Campeche | Fabaceae | Lysiloma | <i>Lysiloma latisiliquum</i> (L.) Benth. |
| Jiménez-Pérez et al. (2012) | Ciencia UANL | Tamaulipan thornscrub /Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Fabaceae and Ebenaceae | Acacia and Diospyros | <i>Diospyros texana</i> Scheele, <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd and <i>A. rigidula</i> Benth. |
| León-De la Luz, Domínguez-Cadena, and Medel-Narváez (2012) | Botanical Sciences | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Baja California Sur | Fabaceae | Lysiloma | <i>Lysiloma microphyllum</i> Benth. |
| López-Toledo, Valdez-Hernández, Pérez-Farrera, and Cetina-Alcalá (2012) | Revista Mexicana de Ciencias Forestales | Seasonal evergreen forest and Tropical deciduous forest/ Selva mediana subperennifolia y selva baja caducifolia | Chiapas | Fabaceae and Malvaceae | Lonchocarpus and Guazuma | <i>Lonchocarpus minimiflorus</i> Donn. Sm. and <i>Guazuma ulmifolia</i> Lam. |
| Zamora-Crescencio et al. (2012) | Polibotánica | Seasonal evergreen forest and Thorn forest/ Selva mediana subperennifolia y selva baja subperennifolia | Campeche | Moraceae | Brosimum | <i>Brosimum allicastrum</i> Sw. |
| Zepeda-Gómez, Lot-Helgueras, Nemiga, and Madrigal-Uribe (2012) | Acta Botánica Mexicana | Gallery forest/ Bosque de galería | Estado de México | Salicaceae | Salix | <i>Salix babylonica</i> L. |
| Pequeño-Ledezma et al. (2012) | Ciencia UAT | Tamaulipan thornscrub / Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Fabaceae | Acacia | <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd. |
| Guerra-De la Cruz, López-Domínguez, López-Upton, Bautista-Sampayo, and Hernández-García (2012) | Revista Mexicana de Ciencias Forestales | Ayarin forest/ Bosque de ayarín | Puebla and Tlaxcala | Pinaceae | Pseudotsuga | <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco |
| Téllez-García and Valdez-Hernández (2012) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Mangroves/ Manglares | Colima | Combretaceae | Laguncularia | <i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C. F. Gaerth. |
| Navarro-Martínez, Durán-García, and Méndez-González (2012) | Madera y Bosques Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Seasonal evergreen forest / Selva mediana subperennifolia | Quintana Roo | Burseraceae and Sapotaceae | Bursera and Manilkara | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg. and <i>Manilkara sapota</i> (L.) P. Royen |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)

Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|---|---|---|-----------------|----------------------------|---|--|
| Alanís-Rodríguez et al. (2013) | Phyton | Tamaulipan thornscrub / Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Fabaceae and Euphorbiaceae | Prosopis, Mimosa, Acacia and <i>Bernardia</i> | <i>Bernardia myricaeifolia</i> (Scheele) S. Wats., <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd., <i>Mimosa monancistra</i> Benth. and <i>Prosopis laevigata</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) M. C. Johnston |
| Dominguez-Gómez et al. (2013) | Revista Mexicana de Ciencias Forestales | Tamaulipan thornscrub / Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Fabaceae | Prosopis | <i>Prosopis laevisgata</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) M. C. Johnston |
| Foroughbakhch, Alvarado-Vázquez, Carrillo-Parras, Hernández-Piñero, and Guzmán-Lucio (2013) | Phyton | Tamaulipan thornscrub / Matorral espinoso tamaulipeco | Tamaulipas | Fabaceae | Prosopis | <i>Prosopis glandulosa</i> Torr. |
| García-De la Cruz, Olivares-López, and Ramos-Prado (2013) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Cloud forest/Bosque mesófilo de montaña | Veracruz | Fagaceae | Quercus | <i>Quercus salicifolia</i> Née |
| Gutiérrez-Báez, Zamora-Crescencio, and Puc-Garrido (2013) | Forestal Veracruzana | Seasonal evergreen forest / Selva mediana subperennifolia | Campeche | Combretaceae | Terminalia | <i>Terminalia buceras</i> L. |
| Hernández-Salas et al. (2013) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Pine forest/Bosque de pino | Chihuahua | Pinaceae | Pinus | <i>Pinus arizonica</i> Engelm. |
| Hernández-Salas et al. (2013) | Revista Forestal Baracoa | Pine forest/Bosque de pino | Chihuahua | Pinaceae | Pinus | <i>Pinus arizonica</i> Engelm. |
| Martínez-Cruz et al. (2013) | Revista Mexicana de Biodiversidad | Tropical deciduous forest / Selva baja caducifolia | Michoacán | Boraginaceae | Cordia | <i>Cordia elaeagnoides</i> A. DC. |
| Molina-Guerra et al. (2013) | Revista Mexicana de Ciencias Forestales | Tamaulipan thornscrub / Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Fabaceae | Acacia | <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd., <i>A. rigidula</i> Benth. and <i>A. berlandieri</i> Benth. |
| Mora-Donjuán et al. (2013) | Ecología Aplicada | Tamaulipan thornscrub / Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Fabaceae and Ebenaceae | Acacia and Diospyros | <i>Diospyros texana</i> Scheele and <i>Acacia amentacea</i> DC. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)**Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)**

| References/Referencias | Journal/Revista | Ecosystem/Ecosistema | State/Entidad | Family/Familia | Genus/Género | Species/Especie |
|--|---|--|---------------|------------------------------------|--|--|
| Mora-Donjuán et al. (2013) | Revista Mexicana de Ciencias Forestales | Tamaulipan thornscrub/ Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Fabaceae and Ebenaceae | <i>Prosopis</i> , <i>Diospyros</i> and <i>Acacia</i> | <i>Diospyros texana</i> Scheele, <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Wild. and <i>Prosopis laevigata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M. C. Johnst. <i>Acacia rigidula</i> Benth., <i>Quercus canbyi</i> Trel. and <i>Havardia pallens</i> (Benth.) |
| Ramírez-Lozano et al. (2013) | Madera y Bosques | Pine-oak, Tamaulipan thornscrub, Submontane scrub/Pino-Encino, matorral espinoso tamaulipeco, matorral submontano | Nuevo León | Fagaceae and Fabaceae | <i>Quercus</i> , <i>Havardia</i> and <i>Acacia</i> | <i>Bernardia myricaefolia</i> (Scheele) S. Watson, <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Wild., <i>A. rigidula</i> Benth. |
| Jiménez, Alanís, González, Aguirre, and Treviño (2013) | The Southwestern Naturalist | Tamaulipan thornscrub/ Matorral espinoso tamaulipeco | Nuevo León | Euphorbiaceae and Fabaceae | <i>Bernardia</i> and <i>Acacia</i> | <i>Bernardia myricaefolia</i> (Scheele) S. Watson, <i>Acacia farnesiana</i> (L.) Wild., <i>A. rigidula</i> Benth. |
| Gelviz-Gelvez & Pavón-Hernández (2013) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Mezquital xerophilous vegetation/Mezquital xerófilo | Hidalgo | Asteraceae | <i>Zaluzania</i> | <i>Zaluzania augusta</i> (Lag.) Sch. Bip. |
| Fernández-Pérez, Ramírez-Marcial, and González-Espinoza (2013) | Botanical Sciences | Pine-oak/Pino-encino | Chiapas | Pinaceae, Cupresaceae and Fagaceae | <i>Pinus</i> , <i>Cupressus</i> and <i>Quercus</i> | <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl., <i>Cupressus lusitanica</i> Mill. and <i>Quercus rugosa</i> Née |
| Benítez-Malvido, Gallardo-Vásquez, Álvarez-Añorve, and Avila-Cabadiña (2014) | American Journal of Botany | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Jalisco | Burseraceae | <i>Bursera</i> sp. | <i>Bursera</i> and <i>Pouteria</i> |
| Carreón-Santos and Valdez-Hernández (2014) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Seasonal evergreen forest/Selva mediana subperennifolia | Quintana Roo | Burseraceae and Sapotaceae | <i>Bursera</i> and <i>Pouteria</i> | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg. and <i>Pouteria reticulata</i> (Eng.) Eyma |
| Dzib-Castillo, Chanatásig-Vaca, and González-Valdivia (2014) | Revista Mexicana de Biodiversidad | Tropical deciduous forest and Semi-evergreen seasonal forest/Selva baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia | Camppeche | Ebenaceae, Polygonaceae | <i>Diospyros</i> and <i>Coccoloba</i> | <i>Coccoloba barbadensis</i> Jacq. and <i>Diospyros tetrasperma</i> Sw. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)
Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|--|---|--|-------------------------|--|--|--|
| Echeverría, Arreola, Esparza-Olgún, Morales, and López (2014) | Forestá Veracruzana | Seasonal evergreen forest/ Selva mediana subperennifolia | Camppeche | Myrtaceae, Sapotaceae and Fabaceae | Myrciaria, Pouteria and Piscidia | Pouteria reticulata (Engl.) Eyma, Myrciaria floribunda (Wild.) O. Berg. and Piscidia piscipula L. |
| Fortanelli-Martínez, García-Pérez, and Castillo-Lara (2014) | Acta Botánica Mexicana | Cloud forest/Bosque mesófilo de montaña | San Luis Potosí | Altingiaceae, Lauraceae and Myrtaceae | Liquidambar styraciflua L., Persea liebmannii Mez and Eugenia xalapensis (Kunth) DC | |
| Gutiérrez-Báez, Zamora-Crescencio, and Hernández-Mundo (2014) | Forestá Veracruzana | Semi-evergreen seasonal forest/ Selva mediana subaducifolia | Camppeche | Burseraceae | Bursera simaruba (L.) Sarg. | |
| Ignacio-Ruiz, Rangel-Villafranco, and Cárdenas-Camargo (2014) | Revista Iberoamericana de Ciencias Forestales | Oak forest/Bosque de encino | Estado de México | Fagaceae | Quercus | |
| Jiménez, Damon, Ochoa-Gaona, and Clark (2014) | Forest Ecology and Management | Pine-oak, Cloud forest, pine forest and Oak forest/ Pino-encino, bosque mesófilo de montaña, bosque de pino y bosque de encino | Oaxaca | Fagaceae | Quercus | |
| López-Pérez, Castillo-Acosta, Zavala-Cruz, and Hernández-Trejo (2014) | Polibotánica | Tropical rain forest and Seasonal evergreen forest/ Selva alta perennifolia y selva mediana perennifolia | Chiapas | Fabaceae, Actinidiaceae and Arecaceae | Lonchocarpus oliganthus F. J. Herm., Saurauia yasicae Loes. and Astrocarum mexicanum Liebm. ex Mart. | |
| Mata et al. (2014) | Revista Iberoamericana de Ciencias Forestales | Desert known in Mexico as Matorral desértico rosetófilo, Submontane scrub and Desert known in Mexico as Matorral desértico microfílio/ Matorral desértico rosetófilo, matorral submontano y matorral desértico microfílio | Coahuila and Nuevo León | Fabaceae | Prosopis | |
| Méndez-Toribio, Martínez-Cruz, Cortés-Flores, Rendón-Sandoval, e Ibarra-Manríquez (2014) | Revista Mexicana de Biodiversidad | Tropical deciduous forest/ Selva baja caducifolia | Michoacán | Boraginaceae | Cordia | |
| Molina, Rechy, Alcalá, Marín, and Alanís (2014) | Revista Iberoamericana de Ciencias Forestales | Submontane scrub/ Matorral submontano | Nuevo León | Fabaceae | Acacia | |
| | | | | | | <i>Cordia elaeagnoides</i> A. DC. <i>Acacia amentacea</i> DC. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)

Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|--|---|--|---------------------|--|-------------------------------------|--|
| Mora-Donjuán et al. (2014) | Polibotánica | Desert known in Mexico as Matorral desértico microfilo / Matorral desértico microfilo | Nuevo León | Fabaceae | Prosopis | <i>Prosopis glandulosa</i> Torr. |
| Palacios-Wassenaar, Castillo-Campos, Vázquez-Torres, and Del Amo-Rodríguez (2014) | Revista Mexicana de Biodiversidad | Semi-evergreen seasonal forest / Selva mediana subcaducifolia | Veracruz | Fabaceae, Anacardiaceae and Annonaceae | Aphanante, Comocladia and Mosannona | <i>Aphanante monoica</i> (Hemsl.) Leroy, <i>Mosannona depressa</i> (Baill.) Chatrou and <i>Comocladia engleriana</i> Loes. |
| Rosales-Adame, Cuevas-Guzmán, Gliessman, and Benz (2014) | Tropical and Subtropical Agroecosystems | Semi-evergreen seasonal forest / Selva mediana subcaducifolia | Jalisco and Nayarit | Fabaceae | Hymenaea and Enterolobium | <i>Hymenaea courbaril</i> L. and <i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb. |
| Rubio, González, Jiménez, Alanís, and Ávila-Flores (2014) | Ciencia UANL | Pine-oak/Pino-encino | Nuevo León | Pinaceae | Pinus | <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl. |
| Santana et al. (2014) | Revista Mexicana de Biodiversidad | Cloud forest/Bosque mesofilo de montaña | Michoacán | Styracaceae | Styrax | <i>Styrax argenteus</i> C. Presl. |
| Santiago-Pérez, Ayón-Escobedo, Rosas-Espinoza, Rodríguez-Zaragoza, and Toledo-González (2014) | Revista Mexicana de Ciencias Forestales | Gallery forest/ Bosque de galería | Jalisco | Betulaceae | Alnus | <i>Alnus acuminata</i> Kunth. |
| García-Licona, Esparza-Olguín, and Martínez-Romero (2014) | Polibotánica | Seasonal evergreen forest / Selva mediana subperennifolia | Campeche | Fabaceae, Rubiaceae and Burseraceae | Lysiloma, Guettarda and Bursera | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg., <i>Lysiloma latisiliquum</i> (L.) Benth. and <i>Guettarda combisii</i> Urb. |
| Méndez-Osorio, Alanís-Rodríguez, Jiménez-Pérez, Aguirre-Calderón, and Treviño-Garza (2014) | Ciencia UANL | Pine-oak/Pino-encino | Guerrero | Pinaceae | Pinus | <i>Pinus radiata</i> D. Don |
| Chablé-Pascual et al. (2015) | Ecosistemas y Recursos Agropecuarios | Tropical rain forest, savanna and induced grassland / Selva alta perennifolia, sabana y pastizales inducidos | Tabasco | Bignoniaceae and Fabaceae | Tabebuia and Erythrina | <i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) DC. and <i>Erythrina americana</i> Miller |
| Luna-Bautista, Hernández-de la Rosa, Velázquez-Martínez, Gómez-Guerrero, and Acosta-Mireles (2015) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Pine-oak and Oak forest / Pino-encino y bosque de encino | Oaxaca | Pinaceae | Pinus | <i>Pinus oaxacana</i> Mirov. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)

Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References/Referencias | Journal/Revista | Ecosystem/Ecosistema | State/Entidad | Family/Familia | Genus/Género | Species/Especie |
|--|---|--|------------------|---|--|---|
| Ruiz-Aquino, Valdez-Herrández, Romero-Manzanares, Manzano-Méndez, and Fuentes-López (2015) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Pine-oak/Pino-encino | Oaxaca | Fagaceae | Quercus | <i>Quercus crassifolia</i> Humb. & Bonpl. |
| Sarmiento, Alanís, Mata, Jiménez, and Treviño (2015) | Ciencia UANL | Submontane scrub/ Matorral submontano | Nuevo León | Rutaceae | Casimiroa | <i>Casimiroa pringlei</i> (S. Watson) Engl. ex Engl. & Prantl |
| Santibáñez-Andrade, Castillo-Argüero, and Martínez-Orea (2015) | Bosque | Pine forest and <i>Abies</i> forest/ Bosque de pino y bosque de <i>Abies</i> | Ciudad de México | Fagaceae and Pinaceae | Quercus, <i>Pinus</i> and <i>Abies</i> | <i>Abies religiosa</i> (Kunth Schlehd. et Cham.), <i>Quercus laurina</i> Humb. & Bonpl., <i>Q. rugosa</i> Néé and <i>Pinus hartwegii</i> Lindl. |
| Valenzuela-Núñez et al. (2015) | Interciencia | Mezquital xerophilous vegetation/ Mezquital xerófilo | Durango | Fabaceae | Prosopis | <i>Prosopis laevigata</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) M. C. Johnst |
| Alanís-Rodríguez et al. (2015 ^a) | Botanical Sciences | Tamaulipan thornscrub, desert known in Mexico as Matorral desértico rosetófilo, Submontane scrub and Desert known in Mexico as Matorral desértico micrófilo / Matorral espinoso tamaulipeco, matorral desértico rosetófilo, matorral submontano y matorral desértico micrófilo | Nuevo León | Fabaceae, Boraginaceae, Ulmaceae and Rutaceae | Prosopis, <i>Havardia</i> , <i>Acacia</i> , <i>Cordia</i> , <i>Celtis</i> and <i>Zanthoxylum</i> | <i>Prosopis glandulosa</i> Torr., <i>Havardia pallens</i> (Benth.), <i>Acacia</i> sp., <i>Cordia boissieri</i> A. DC., <i>Celtis</i> sp. and <i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg. |

Annex 1. Summary of 161 studies that contain some of the tree species of ecological importance in Mexico, ordered chronologically. (cont.)

Anexo 1. Resumen de los 161 trabajos que contienen a algunas de las especies arbóreas de importancia ecológica en México, ordenados cronológicamente. (cont.)

| References / Referencias | Journal / Revista | Ecosystem / Ecosistema | State / Entidad | Family / Familia | Genus / Género | Species / Especie |
|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Alanís-Rodríguez et al. (2015b) | Acta Botánica Mexicana | Submontane scrub / Matorral submontano | Nuevo León | Fabaceae and Rutaceae | Acacia and Zanthoxylum | Acacia amentacea D. C. and <i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg. |
| Alanís-Rodríguez et al. (2015c) | Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente | Pine-oak / Pino-encino | Nuevo León | Pinaceae and Fagaceae | <i>Pinus</i> and <i>Quercus</i> | <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl. and <i>Quercus ryphylla</i> Weath. (<i>Gremm.</i>) Gousolin |
| Block and Meave (2015) | Botanical Sciences | Oak forest / Bosque de encino | Morelos | Fagaceae and Styracaceae | <i>Quercus</i> and <i>Styrax</i> | <i>Quercus castanea</i> Née, <i>Quercus rugosa</i> Née, <i>Q. obtusata</i> Bonpl. and <i>Styrax ramirezae</i> (Gremm.) Gousolin |
| Castillón et al. (2015) | The Science of Nature | Pine-oak, Tamaulipan thornscrub, Pine forest, Pinewood forest / Pino-encino, matorral espinoso tamaulipeco, bosque de pino, matorral de coníferas | Nuevo León and Tamaulipas | Pinaceae, Fagaceae and Fabaceae | <i>Pinus</i> , <i>Quercus</i> and <i>Havardia</i> | <i>Pinus pseudostrobus</i> Lindl., <i>P. teocote</i> Schiede ex Schltdl. et Cham., <i>P. culminicola</i> Andresen & Beaman, <i>P. hartwegii</i> Lindl., <i>Quercus canhyi</i> Trel., <i>Havardia pallens</i> (Benth.) Britton & Rose and <i>Q. greggii</i> (A. DC.) Trel. |
| García, Valdez, Luna, and López (2015) | Madera y Bosques | Seasonal evergreen forest / Selva mediana subperennifolia | Veracruz | Burseraceae and Boraginaceae | <i>Bursera</i> and <i>Cordia</i> | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg., <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Cham. |
| Granados, Granados, and Sánchez-González (2015) | Madera y Bosques | Pine forest / Bosque de pino | Puebla, Tlaxcala and Veracruz | Pinaceae | <i>Pinus</i> | <i>Pinus cembroides</i> Zucc. |
| Williams-Linera, López-Barrera, and Bonilla-Moheno (2015) | Madera y Bosques | Cloud forest / Bosque mesófilo de montaña | Veracruz | Fabaceae | <i>Acacia</i> | <i>Acacia pennatula</i> (Schltrd.) & Cham.) Benth. |